

2018年《中医学综合知识与技能》真题

一、最佳选择题

1. 某女，35岁，因家庭纠纷，情志不畅导致肝气郁结，影响脾胃运化功能，疾病传变的是

- A. 相克
- B. 子病及母
- C. 相乘
- D. 母病及子
- E. 相侮

【答案】C

【解析】



2. 脏腑经络功能减退，血液生成不及，运行迟缓，水液在体内滞留等病变，与气机功能失常密切相关的是

- A. 温煦作用

- B.推动作用
- C.防御作用
- D.固摄作用
- E.气化作用

【答案】B

【解析】

第09讲 生命活动的基本物质、经络、体质

正保医学教育网
www.med66.com

(三) 气的功能

- 推动作用**
 - 推动生长发育
 - 推动脏腑组织器官功能活动
 - 推动血液生成和运行
 - 推动津液的生成和输布
- 温煦作用**
 - 维持正常体温；气虚会导致体温下降
 - 维持各脏腑组织器官、经络进行正常的生理活动
 - 使血和津液保持液态，不至凝聚，在体内运行
- 防御作用**
 - 护卫肌表，防止外邪入侵
 - 与侵入体内的各种邪气进行斗争；防御疾病发生
- 固摄作用**
 - 防止精、血、津液等物质无故流失
 - 维护脏腑器官各自位置的相对稳定
- 气化作用**
 - 气、血、精、津液等物质的新陈代谢

3. 某女，35岁。出现表情淡漠，寡言少语，闷闷不乐，哭笑无常等症状，其临床意义是

- A.失神
- B.少神
- C.假神
- D.神乱
- E.无神

【答案】D

【解析】

第01讲 中医诊断基础（一）

正保医学教育网
www.med66.com

续表

望神	表现	病机
假神	原来不欲言语，语声低弱，时断时续突然转为言语不休者，原来精神极度衰颓，意识不清，突然精神转“佳”者，原来面色十分晦暗，忽然两颧发红如妆者	“回光返照”或“残灯复明” 阴阳格拒 虚阳欲脱
	表情淡漠，寡言少语，闷闷不乐，继则精神发呆，哭笑无常	痰气凝结、阻遏心窍 癔病
神乱	烦躁不宁，登高而歌，弃衣而走，呼号怒骂，打人毁物，不避亲疏	属痰火扰心
	若突然跌倒，昏不知人，口吐涎沫，四肢抽动	属痰迷心窍、痫病

4. 八纲辨证中，寒热症候主要辨证的是

- A. 疾病部位
- B. 疾病原因
- C. 疾病性质
- D. 病势趋向
- E. 疾病传变

【答案】C

【解析】

第04讲 中医诊断基础（一）

正保医学教育网
www.med66.com

3. 八纲：指阴阳、表里、寒热、虚实八个辨证要素，也是辨证的纲领。

- (1) 寒热用以分辨疾病属性。 A
- (2) 表里用以分辨疾病病位与病势的浅深。
- (3) 虚实用以分辨邪正的盛衰。
- (4) 阴阳是区分疾病类别的总纲。

5. 表热证用辛凉解表方药，里热证用清热泻火方药质量，体现的治法是

- A. 寒者热之
- B. 热者寒之
- C. 用热远热
- D. 寒因寒用
- E. 热因热用

【答案】B

【解析】

第04讲 常见病辨证论治

正保医学教育网
www.med66.com

表3-1 正治与反治的治则与治法

治则	治法	治法用药	适应证	适应症分类
正治 (逆治)	寒者热之	寒性病证出现寒象，用温热方药进行治疗	实寒证	表寒证用辛温解表药 里寒证用辛热温里药
	热者寒之	热性病证出现热象，用寒凉方药进行治疗	实热证	表热证用辛凉解表药 里热证用苦寒清里药
反治 (从治)	虚则补之	虚损性病证，用补益药物治疗	虚寒证	阳虚用温阳药 阴虚用滋阴药 气虚用补气药 血虚用补血药
	实则泻之	实性病证，用攻逐邪气药物治疗	实热证	痰饮停留用逐水药 胃肠腑用消食导滞药 血用活血化瘀药 气滞用理气行滞药

6.某男, 32 岁。近 3 天所在单位多人发热, 患者 1 天前突然发热, 高热不退, 周身酸痛, 无汗, 口干咽喉疼痛, 舌质红, 苔黄, 脉浮数, 应选用的中医治法是

- A. 辛凉解表
- B. 辛温解表
- C. 益气解表
- D. 解表除湿
- E. 清热解毒

【答案】E

【解析】

第02讲 中医内科病证的辨证论治 (一)


正保医学教育网
www.med66.com

续表

辨证	症状	治法	中成药
时行感冒	突然发热, 高热不退, 甚则寒战, 周身酸痛, 无汗, 咳嗽, 口干, 咽喉疼痛, 伴明显全身症状, 呈现流行性发作。舌红, 苔黄, 脉浮数	清热解毒	清开灵颗粒 (口服液)、羚羊感冒片、清瘟胶囊
体虚感冒	发热, 恶寒较甚, 无汗, 头痛鼻塞, 身楚倦怠, 咳嗽, 咳痰无力。舌淡, 苔白, 脉浮无力	益气解表 宣肺	

7.某女, 25 岁。胃痛吐酸, 喜温恶寒, 舌淡, 苔薄白, 脉弦紧, 医生诊断后开具处方: 高良姜、香附、延胡索、吴茱萸、木香, 以温中散寒, 和胃止痛治疗。该患者适宜的服药时间是

- A. 饭前
- B. 饭后
- C. 睡前
- D. 空腹
- E. 频服

【答案】B

【解析】

第02讲 中药调剂操作的基本技能知识（二）

正保医学教育网
www.med66.com

(三) 处方的用法用量

1. 饮片处方的服用

(1) 内服汤剂 (表7-8)

表7-8 汤剂的内服方法

名称	具体内容
药液温度	温而不凉时服用, 热病冷服, 寒病热服
服用次数	2次, 重病急病可隔4小时服药一次
服药时间	饭后服 一般药、健胃药、对胃肠刺激性药
	饭前服 滋补药
	空腹服 驱虫药、泻下药
	睡前服 安眠药
	抗疟药宜在发作前1~2小时服用

8. 某女, 25岁, 不寐, 心烦, 口渴, 咽燥, 口舌生疮, 小便短赤, 舌尖红, 苔薄, 脉数, 应选用的中成药是

- A. 人参归脾丸
- B. 天王补心丸
- C. 朱砂安神丸
- D. 养血安神丸
- E. 解郁安神颗粒

【答案】C

【解析】

第02讲 中医内科病证的辨证论治（一）

正保医学教育网
www.med66.com

表3-9 不寐的辨证论治

辨证	症状	治法	方剂	中成药
心火炽盛	不寐, 心烦, 口干, 舌燥, 口舌生疮, 小便短赤, 舌尖红, 苔薄白, 脉数有力或细数	清心泻火	朱砂安神丸	朱砂安神丸
肝气郁结	不寐, 情志变化则加重, 平时情志抑郁, 胸胁胀痛, 暖气时作, 或胸闷喜太息, 舌苔薄白, 脉弦	疏肝解郁	柴胡疏肝散	解郁安神颗粒

9. 湿度是影响药物质量的一个重要因素, 不仅可引起药物的物理和化学变化, 如含水量, 外观形态, 化学成分发生改变等, 而且能影响微生物的繁殖及害虫的生长。一般中药炮制品的质量控制和贮藏要求应是

- A. 绝对含水量应控制在 7%~13%, 贮存环境的相对湿度应控制在 35%~75%
- B. 绝对含水量应控制在 9%~13%, 贮存环境的相对湿度应控制在 30%~70%

- C.绝对含水量应控制在 7%~15%，贮存环境的相对湿度应控制在 35%~75%
 D.绝对含水量应控制在 9%~15%，贮存环境的相对湿度应控制在 35%~70%
 E.绝对含水量应控制在 8%~15%，贮存环境的相对湿度应控制在 40%~70%

【答案】A

【解析】

第01讲 中药的贮藏与养护

正保医学教育网
www.med66.com

表8-3 引起中药质量变异的环境因素

因素	变异现象
温度	①胶类及树脂类饮片因受热和空气的影响，容易变软而粘连，如乳香、阿胶②温度过低，低于冰点，对于某些新鲜的药物，一些含水量较多的药物会产生有害的影响，如鲜石斛、鲜芦根等
湿度	①一般炮制品的绝对含水量应控制在7%~13%，贮存环境对湿度应控制在35%~75%②当空气相对湿度达到75%~80%、30℃时，易发生霉变现象，特别是含糖类、黏液质，更容易吸潮变质，如天冬、地黄、山药等，某些粉剂吸潮粘连成块③相对湿度高于75%时，多数无机盐易潮解，如芒硝、胆矾④盐炙的饮片也容易吸收空气水分，吸湿后饮片表面也容易霉变，如炙甘草、炙黄芪、

10. 小青龙汤治疗痰多咳喘，处方为：麻黄、白芍、细辛、干姜、甘草、桂枝、半夏、五味子，方中半夏应选用的炮制品是

- A.生半夏
 B.清半夏
 C.姜半夏
 D.法半夏
 E.半夏曲

【答案】D

【解析】

11.某女，36岁，带下色白，量多稀薄，头晕目眩，耳鸣，腰膝酸软，小便频数，大便溏薄，舌质淡润，苔薄白，脉沉迟，其证候是

- A.湿热
 B.痰湿
 C.肾虚
 D.肝郁
 E.脾虚

【答案】C

【解析】

表3-34 带下过多的辨证论治

辨证	症状	治法	方剂	中成药
肾虚带下	带下量多，色白稀薄，淋漓不断，腰酸膝软，头晕目眩，小便频数，大便溏薄。舌淡润，苔薄白，脉沉迟	温肾益气，涩精止带	内补丸	金樱子膏、妇宝颗粒（主治脾虚夹瘀证）、参茸白凤丸（主治肾脾虚弱、气血两亏证）
湿热下注	带下量多，色黄如脓，或赤白相兼，状如米泔，臭秽难闻，小腹疼痛，腰骶酸痛，口苦咽干，小便短赤。舌红，苔黄腻，脉滑数	清热解带，利湿止带	止带方、若属肝经湿热下注者，用龙胆泻肝汤	白带丸、妇科止带片、妇炎净胶囊、妇科千金片（主治湿热瘀阻）、妇炎康片（主治湿热下注、毒瘀互阻证）、盆炎净颗粒（主治湿热瘀阻证）

- 12.关于中成药之间配伍应用主要形式的说法，错误的是
- 功效不同的中成药配伍应用，辅药能够提高主药的功
 - 含有毒成分的中成药配伍应用，可起到以毒攻毒的作用
 - 功效相似的中成药合理配伍应用，可起到协同增效作用
 - 两药同用，一种中成药能够抑制另一种中成药的副作用
 - 中成药配伍应用可采用内服与外用相结合的治法

【答案】B

【解析】

(二) 含有毒药物中成药的联用

- 大活络丸与天麻丸合用，两者均含附子。
- 朱砂安神丸与天王补心丸合用，两者均含朱砂。
- 复方丹参滴丸和速效救心丸，两者均含有冰片。

因含同种毒性成分，在临床应用中使用其中一种时，在几种含有有毒成分或相同成分的中成药联用时，分或相同成分的“叠加”，以免引起不良反应。

- 13.医生在中药处方中应用不同的术语，对饮片炮制、产地、质地、采时新陈、颜色、气味等有特殊要求加以注明。下列与药名有关的属于中，属于对质地有特殊要求的是

- 田三七
- 江枳壳
- 陈香橼
- 明天麻
- 紫丹参

【答案】D

【解析】

第01讲 中药调剂操作的基本技能知识(一)

正保医学教育网
www.med66.com

三、处方的常用术语

(一) 与药名有关的术语

与药名有关的术语见表7-2。

表7-2 与药名有关的术语

类别	举例
炮制类	酒蒸大黄、蜜炙麻黄、炒山药
修治类	远志去心、山茱萸去核、乌梢蛇去头去鳞片
产地类	怀山药、田三七、东阿胶、杭白芍、广藿香、
品质类	明天麻、子黄芩、左牡蛎、左秦艽、金毛狗脊、 蹄决明、九孔石决明
采时、 新陈类	绵茵陈、陈香橼、陈佛手、陈皮、嫩桂枝、鲜芦根、 霜桑叶
颜色、 气味类	紫丹参、香白芷、苦杏仁

14. 某男，19岁。面部粟疹累累，疼痛，色红，部分有脓疱，口渴，大便秘结，小便短赤，舌质红，苔薄黄，脉弦滑。应选用的中成药是

- A. 黄连上清丸
- B. 牛黄解毒丸
- C. 当归苦参丸
- D. 牛黄清心丸
- E. 防风通圣丸

【答案】A

【解析】

第09讲 中医外科病证的辨证论治

正保医学教育网
www.med66.com

表3-27 痤疮的辨证论治

辨证	症状	方剂	中成药
肺经风热	面部粟疹累累，色红，痒或有脓疱，伴口干渴、大便秘结，小便短赤。舌质红，苔薄黄，脉弦滑	枇杷清肺饮	黄连上清丸
胃肠湿热	颜面、胸背皮肤油腻，皮疹红肿疼痛，口臭，便秘，溲黄。舌质红，苔黄腻，脉滑数	茵陈蒿汤	防风通圣丸、清痤丸
痰湿瘀滞	皮疹颜色暗红，以结节、肿、囊肿、瘢痕为主，或伴窦道，经久难愈；伴纳呆腹胀。舌质暗红或有瘀斑，苔黄腻，脉弦滑	二陈汤合桃红四物汤	当归苦参丸、连翘败毒丸

15. 某女，55岁。患2型糖尿病7年，头晕目眩，口干喜饮，神疲健忘，倦怠乏力，遇劳则发，腰膝酸软，手足心热，舌淡红有齿痕，脉沉弱。执业药师建议配伍使用的中成药应是

- A. 生脉胶囊与济生肾气丸

- B.大补阴丸与六味地黄丸
- C.补中益气丸与六味地黄丸
- D.香砂六君丸与金匱肾气丸
- E.脑立清胶囊与六味地黄丸

【答案】C

【解析】

16.处方直接写药名，需调配麸炒品的品种是

- A.白芥子
- B.骨碎补
- C.补骨脂
- D.白僵蚕
- E.莱菔子

【答案】D

【解析】

第01讲 中药调剂操作的基本技能知识（一）

正保医学教育网
www.med66.com

2.饮片的处方应付

(1) 常见的处方应付

分类	重要考点	技巧
清炒品	(蔓荆、苍耳、牛蒡、白芥、紫苏、莱菔)子、谷芽、麦芽、王不留行、酸枣仁	(), 多子, 炒心
麸炒品	白术、僵蚕、枳壳	
炮制品	天南星(矾制)、何首乌、草乌(水制)、川乌(水制)、附子(炮制)、吴茱萸(甘草水制)、远志(甘草水制去心)、厚朴(姜制)	
烫制品	龟甲、鳖甲、穿山甲	

17.某男，32岁。大便带血，滴血，有时呈喷射状出血，血色鲜红，肛门瘙痒，舌质红，苔薄白，脉数。应选用的方剂是

- A.凉血地黄汤加减
- B.黄土汤加减
- C.脏连丸加减
- D.归脾丸加减
- E.补中益气丸加减

【答案】A

【解析】

表3-29 痔疮的辨证论治

辩证	症状	治法	方剂	中成药
内痔 肠风下血	大便带血，滴血或喷射状出血，血色鲜红，或有肛门瘙痒。舌红，苔薄白或薄黄，脉浮数	清热凉血祛风	凉血地黄汤	槐角丸
湿热下注	便血色鲜红，量较多，肛内肿物外脱，可自行回缩，肛门灼热。舌红，苔黄腻，脉弦数	清热利湿止血	脏连丸	

18. 患儿，6个月，近日脘腹胀满，嗳腐酸馊，时呕吐，哭闹，大便酸臭，手足心热，舌苔白厚腻，指纹紫滞。应选用的方剂是

- A. 健脾丸加减
- B. 二陈汤加减
- C. 消乳丸加减
- D. 温胆汤加减
- E. 理中汤加减

【答案】C

【解析】

表3-36 积滞的辨证论治

辩证	症状	治法	方剂	中成药
乳食内积	不思乳食，嗳腐酸馊或呕吐食物、乳片，脘腹胀满，疼痛拒按，大便酸臭或便秘，肚腹热甚，心烦，夜眠不安，低热，手足心热。苔白厚腻或黄腻，脉弦滑，或指纹紫滞	消乳化食，和中导滞	乳积用消乳丸，食积用保和丸	小儿消食片、开胃山楂丸、枳实导滞丸（主治饮食积滞、湿热内蕴证）、四磨汤口服液、大山楂丸、保和颗粒（丸）
脾虚夹积	面色萎黄，形体消瘦，神疲肢倦，不思乳食，腹满喜按，大便稀溏腥臭，夹乳片或不消化食物残渣。舌质淡，苔白腻，脉濡细而滑，或指纹淡滞	健脾助运，消食化滞	健脾丸	健胃消食片、健脾丸、开胃健脾丸


19. 蒺藜在自然界分布广泛，种类繁多，不少蒺藜化合物对肝脏有明显毒副作用，可引起急性中毒性肝炎，出现转氨酶升高、黄疸、肝肿大。其中含蒺藜并具有肝脏毒性的中药是

- A. 苍耳子
- B. 黄药子
- C. 蓖麻子
- D. 相思豆

E.望江南子

【答案】B

【解析】



20.某男，43岁。咳嗽气粗，痰多黄稠，严重时痰中夹血或咳鲜血，伴胸闷烦热，汗出，口渴喜冷饮，舌质红，苔黄腻，脉滑数。该患者禁用的中药应是

- A.猪牙皂
- B.黄芩
- C.桑白皮
- D.橘红
- E.法半夏

【答案】A

【解析】

21.某男，66岁。长期吸烟，喘促气短20年，加重10天。症见喘促气短，动则气甚，呼多吸少，气不得续，形寒肢冷，面唇青紫；舌质淡，苔薄白，脉沉弱，其中医证候是

- A.风寒犯肺
- B.风热犯肺
- C.肺脾气虚
- D.肾不纳气
- E.肝气郁结

【答案】D

【解析】

第02讲 中医内科病证的辨证论治（一）

正保医学教育网
www.med66.com

续表

辨证	症状	治法	方剂	中成药
肾不纳气	喘促日久， <u>呼多吸少</u> ，气不得续，动则喘甚，小便常因咳甚而失禁，或尿后余沥，形瘦神疲，汗出肢冷，面唇青紫，或有跗肿，舌淡苔薄，脉沉弱；或见喘咳，面红烦躁，口咽干燥，足冷，汗出如油，舌红少津，脉细	补肾纳气	金匮肾气丸	见

22.某女，27岁，妊娠5个月，因上火导致咽喉肿痛，口苦，小便黄赤，便秘；舌红，苔薄黄，脉弦数。该患者应慎用的中成药是

- A. 咽喉消炎丸
- B. 牛黄上清丸
- C. 牛黄消炎片
- D. 芩翘口服液
- E. 蒲地蓝消炎口服液

【答案】B

【解析】

第03讲 中药调剂操作的基本技能知识（三）

正保医学教育网
www.med66.com

独家记忆：妊娠禁忌属每年必考，需结合中药二中成药一同记忆，禁用药重点掌握十滴水、山楂化滞丸、礞石滚痰丸、三七伤药片、小金丸、麝香保心丸、牛黄解毒丸、血府逐瘀胶囊、少腹逐瘀丸、骨刺宁胶囊、槟榔四消丸、木香槟榔丸、桂枝茯苓胶囊等。

慎用药重点掌握牛黄清心丸、牛黄上清丸、黄连上清丸、防风通圣丸、伤湿止痛膏、枣仁安神胶囊、附子理中丸、桂枝茯苓丸、妇科分清片等。

23.某女，29岁。因全身浮肿就诊，经系统检查为肾病综合征，中医诊断为肾阳亏虚证水肿，采用中西药综合治疗。结合病情，既符合中医辨证，又能增加西药利尿效果的方剂是

- A. 六味地黄汤
- B. 五苓散
- C. 真武汤

- D. 参苓白术散
E. 越婢加术汤

【答案】CE

【解析】

批注 [w用1]: E 也可以选的

第02讲 中西药的联合应用

正保医学教育网
www.med66.com

桂枝茯苓丸、当归四逆加吴茱萸生姜汤等	血管扩张药	增强作用，有利于微
黄连解毒汤、大柴胡汤等	抗动脉粥样硬化、降血脂剂	增强疗效
木防己汤、真武汤、越婢加术汤、分消汤等	利尿药	增强利尿效果
枳实	庆大霉素	枳实能松弛大霉素进入
小青龙汤、柴朴汤等	氨茶碱、色甘酸钠等	提高对支气
麦门冬汤、滋阴降火汤等	磷酸可待因	可提高对

24. 某女，55岁，大便艰涩，排出困难，腹冷腹痛，小便清长，畏寒喜暖，面色无华，舌质淡，苔薄白，脉沉迟，应选用的方剂是

- A. 六磨汤加减
B. 麻子仁丸加减
C. 润肠丸加减
D. 半硫丸加减
E. 大承气汤加减

【答案】D

【解析】

www.med66.com

第03讲 中医内科病证的辨证论治（二）

正保医学教育网
www.med66.com

续表

辨证	症状	治法	方剂	中成药
津亏肠燥	大便秘结，面色无华，头晕目眩，心悸，口干舌淡，脉细涩	养血润燥	润肠丸	麻仁润肠丸、麻仁丸、麻仁滋脾丸、通乐颗粒
阳虚寒凝	大便艰涩，排便困难，小便清长，畏寒喜暖，面色（白光）白，唇淡口和，或兼腹冷腹痛。舌淡苔白，脉沉迟	温通开秘	半硫丸或附桂八味丸	桂附地黄与麻仁滋脾丸合用

25. 某患者因治疗需要使用柴胡注射液后出现过敏性休克，立即停药并及时抢救后痊愈，

后该患者因使用其他药物导致原有疾病加重，出现并发症死亡。现填写该患者只用柴胡注射液的不良反应报告。对不良反应/事件的结果应填写

- A.死亡
- B.痊愈
- C.有后遗症
- D.未好转
- E.不详

【答案】B

【解析】

26.某男，35岁，因患肺结核服用抗结核药治疗，出现肝功能损害。医生建议加用中药，能够减轻抗结核药肝损伤的方剂是

- A.玉屏风散
- B.逍遥散
- C.六君子汤
- D.理中汤
- E.四逆汤

【答案】B

【解析】

第02讲 中西药的联合应用

正保医学教育网
www.med66.com

黄芪、人参、女贞子、刺五加、当归、山茱萸等	西药 化疗药	降低患 胞降低	药而导致的白细 粒
黄连、黄柏、葛根等	抗生素	减少抗生 菌反应	
黄精、骨碎补、甘草等	链霉素	消除 耳	的耳鸣、 耳
逍遥散	抗结核药		肝损伤
含麻黄类中药	巴比妥类 西药		
小柴胡汤、人参汤	丝裂 霉素C		用



27.根据血清脂质检查指标，判断出现血脂异常的是

- A.总胆固醇（TC）4.21mmol/L，低密度脂蛋白（LDL）1.37mmol/L，高密度脂蛋白（HDL）3.04mmol/L
- B.总胆固醇（TC）4.21mmol/L，低密度脂蛋白（LDL）2.37mmol/L，高密度脂蛋白（HDL）4.55mmol/L
- C.总胆固醇（TC）5.61mmol/L，低密度脂蛋白（LDL）4.37mmol/L，高密度脂蛋白（HDL）0.75mmol/L
- D.总胆固醇（TC）3.21mmol/L，低密度脂蛋白（LDL）2.00mmol/L，高密度脂蛋白（HDL）3.05mmol/L
- E.总胆固醇（TC）3.21mmol/L，低密度脂蛋白（LDL）3.00mmol/L，高密度脂蛋白（HDL）

2.05mmol/L

【答案】C

【解析】

第01讲 常用医学检查指标及临床意义

正保医学教育网
www.med66.com

二、脂代谢检查

(一) 总胆固醇 (TC)

总胆固醇的参考值和临床意义见表5-37。

表5-37 总胆固醇的参考值和临床意义

名称	具体内容
参考值	成人：合适范围 < 5.18mmol/L (200mg/dl) 边缘升高：5.18 ~ 6.21mmol/L (200 ~ 240mg/dl) 升高 ≥ 6.22mmol/L (240mg/dl)
临床意义	升高 ①血脂异常：高胆固醇血症或混合型高脂血症； 其他疾病：糖尿病、甲状腺功能减退症、肾病综合征及阻塞性黄疸等；③应用某些药物如糖皮质激素、避孕药、阿司匹林、口服避孕药等；④见于甲状腺功能亢进症、严重贫血、肝病、肾病、慢性酒精中毒、性腺功能减退等 降低 见于甲状腺功能亢进症、严重贫血、肝病、肾病、慢性酒精中毒、性腺功能减退等



第01讲 常用医学检查指标及临床意义

正保医学教育网
www.med66.com

(四) 低密度脂蛋白 (LDL)

低密度脂蛋白的参考值和临床意义见表5-40。

表5-40 低密度脂蛋白的参考值和临床意义

名称	具体内容
参考值	成人：合适范围 < 3.37mmol/L (130mg/dl) 边缘升高 3.37 ~ 4.12mmol/L (130 ~ 159mg/dl) 升高 ≥ 4.14mmol/L (160mg/dl)
临床意义	升高 ①血脂紊乱：高胆固醇血症或混合型高脂血症； ②其他疾病：甲状腺功能减退症、肾病综合征、阻塞性黄疸、肥胖症等 ③药物影响：使用糖皮质激素、β受体阻滞剂、利尿剂等 降低 见于甲状腺功能亢进症、肝硬化、低脂饮食、营养不良等



第01讲 常用医学检查指标及临床意义

正保医学教育网
www.med66.com

(三) 高密度脂蛋白 (HDL)

高密度脂蛋白的参考值和临床意义见表5-39。

表5-39 高密度脂蛋白的参考值和临床意义

名称	具体内容
参考值	成人：合适范围 $\geq 1.04 \text{ mmol/L}$ (40mg/dl)
	升高 $\geq 1.55 \text{ mmol/L}$ (60mg/dl)
	降低 $< 1.04 \text{ mmol/L}$ (40mg/dl)
临床意义	增高 饮酒或长期足量运动可使HDL升高
	降低 ①血脂异常：低高密度脂蛋白血症 ②其他疾病：糖尿病、代谢综合征等 ③其他：高糖和素食、吸烟均可致HDL降低 噻嗪类、雌激素、 β 受体阻滞剂等

28. 预防药物性肾损伤，需要严格掌握各种药物的适应症，避免滥用。关于用药注意事项的说法，错误的是

- A. 含重金属成分的中药可小剂量长期服用
- B. 对某些有肾损害高危因素者，药物应慎用或减量
- C. 数种药物并用时，注意药物间的相互作用
- D. 因慢性病需长期服用可能蓄积的药物，应采用少量、间断服药方法
- E. 一旦发现有肾损害，应立即停药，并给予相应处理

【答案】A

【解析】

第01讲 特殊人群的中药应用

正保医学教育网
www.med66.com

三、中药引起肾损伤的防治原则

1. 药物应用中注意剂量、疗程，用药期间严密监测尿酶蛋白及肾功能。
2. 数种药物并用时，注意药物间的相互作用。
3. 部分中草药有特殊煎煮时间要求，如山豆根煎煮时间越长，则毒性作用越强。避免使用铝锅、铁锅煎药。
4. 如果因慢性病需长期服用某类中药，对有蓄积性药物应采用少量、间断服药的方法。
5. 一旦发现有肾损害，应立即停药，根据不同药的临床表现给予相应处理。

29. 骨骼疾病，如骨损伤、变形性骨炎。骨折恢复期、佝偻病，骨软化症等。出现酶活性升高的是

- A. ALP
- B. ALT
- C. AST

D.AMS

E.γ-GT

【答案】A

【解析】

第01讲 常用医学检查指标及临床意义

正保医学教育网
www.med66.com

四、血清碱性磷酸酶(ALP)

血清碱性磷酸酶的参考值和临床意义见表5-26。

表5-26 血清碱性磷酸酶的参考值和临床意义

名称	具体内容
参考值	连续监测法：成人40~110U/L；儿童<250 U/L
ALP升高	①肝胆疾病：阻塞性黄疸、胆道梗阻、结石、胰头性或慢性病毒性肝炎、肝癌、肝外阻塞②骨骼疾病：骨折、骨疾病、变形性骨炎(Paget病)，使成骨细胞高度的ALP释放入血，如纤维骨炎、骨折恢复期、骨软化症、成骨不全等，因ALP生成亢进而血清ALP升高③用药：羟甲戊二酰辅酶A还原酶抑制剂(他汀类药物)的不良反应，可导致ALP升高

30.某男，69岁。有冠心病史。症见胸痛隐隐，遇劳易发，神疲乏力，气短懒言，心悸自汗，口唇紫暗，舌质紫暗，舌体胖大，边有齿痕，苔薄白，脉结，应选用的中医治法是

- A.行气活血
- B.益气活血
- C.豁痰活血
- D.温阳活血
- E.养阴活血

【答案】B

【解析】

第02讲 中医内科胸证的辨证论治(一)

正保医学教育网
www.med66.com

表3-8 胸痹的辨证论治

辨证	症状	治法	方剂	中成药
气虚血瘀	胸痛隐隐，遇劳则发，神疲乏力，气短懒言，心悸自汗，舌胖有齿痕，色淡暗，苔薄白，脉弱而涩，或结、代	益气活血	补阳还五汤	通心络胶囊、心口服液、胶囊、芪参滴丸、参茸
气滞血瘀	胸痛胸闷，胸肋胀满，心悸。唇舌紫暗，脉涩	行气活血	血府逐瘀汤	血府逐瘀丸、复方丹参滴丸、速效救心丸

31.某小儿因误服大量苦杏仁出现严重中毒反应，其临床表现，主要是

- A.腹痛腹泻，恶心呕吐
- B.呼吸麻痹，瞳孔散大

- C.牙关紧闭，四肢抽搐
- D.面色苍白，瞳孔缩小
- E.胸闷气短，心率减慢

【答案】B

【解析】

第02讲 中药不良反应(二)

正保医学教育网
www.med66.com

表11-21 苦杏仁的不良反应及中毒解救

药物	具体内容
不良反应	苦杏仁分解产生的氢氰酸，会抑制生命中枢，导致呼吸麻痹而死亡
中毒解救	①中毒后用1:2000~1:5000的高锰酸钾液及大量清水或3%过氧化氢充分洗胃催吐，然后服硫代硫酸钠2g，也可用1%硫代硫酸钠溶液洗胃，并留置100ml在胃中，使与胃肠道的氢氰酸结合成无毒的硫氰酸化合物 ②必要时给呼吸兴奋剂、强心剂、镇静剂及升压药物 ③重症病人给细胞色素C

32.根据《中国药典》“凡例”，下列对中药【贮藏】项下的各名称术语解释，正确的是

- A.阴凉处，系指不超过 18℃ 的环境
- B.凉暗处，系指避光并不超过 18℃ 的环境
- C.常温，系指 10~30℃ 的环境
- D.冷处，系指 5~10℃ 的环境
- E.室温，系指 20~30℃ 的环境

【答案】C

【解析】

第01讲 中药的贮藏与养护

正保医学教育网
www.med66.com

5.阴凉处：不超过20℃。

6.凉暗处：避光并不超过20℃。

7.冷处：2~10℃。

8.常温：10~30℃。

33.某女，36岁。咽部干痒灼热，微痛，有异物感，咳嗽少痰，颧红，潮热；舌质红，

苔少，脉细数。应选用的中成药是

- A.清咽利膈丸
- B.玄麦甘桔颗粒
- C.板蓝根颗粒
- D.复方鱼腥草片
- E.利咽解毒颗粒

【答案】B

【解析】

第06讲 中医妇科、儿科及耳鼻喉科病证的辨证论治

正保医学教育网
www.med66.com

表3-40 咽喉肿痛的辨证论治

辨证	症状	治法	方剂	中成药
风热外袭	咽部疼痛，逐渐加重，吞咽或咳嗽时疼痛加剧，咽部红肿，颌下有淋巴结；伴见发热恶风，头痛，咳嗽痰黄。舌质红，苔黄，脉浮数。	疏风清热，消肿利咽	疏风清热汤	复方鱼腥草片、复方草珊瑚片、金嗓开音丸、黄氏响声丸（主治风热外袭、痰热内盛证）、利咽解毒颗粒
火毒上攻	咽喉疼痛红肿，吞咽困难，咽喉如梗，咽部红肿明显，颌下有淋巴结、压痛，伴发热、口渴喜饮、头痛剧，大便短赤，便秘结。舌红苔黄，脉数有力。	泄热解毒，利咽消肿	清咽利膈汤	桂林西瓜霜、板蓝根茶（颗粒）、清咽利膈丸（主治风邪外袭、脏腑积热证）、果丸、清咽丸
虚火上炎	咽部干燥，微痛，干痒，灼热，有异物感，干咳少痰，或痰中带血；或伴颧红潮热，耳鸣多梦。舌红，苔少，脉细数。	滋阴降火，清肺咽喉	养阴清肺汤或知柏地黄丸	玄麦甘桔颗粒、铁笛丸、金果含片、金果饮咽喉片

34.患儿，5岁，形体偏瘦，不思饮食，食而不化，面色萎黄，神倦多汗，大便偏稀，夹有不消化食物，舌质淡，苔薄白，脉弱。应选用的方剂是

- A.异功散加减
- B.养胃增液汤加减
- C.不换金正气散加减
- D.保和丸加减
- E.枳术丸加减

【答案】A

【解析】

表3-37 三和为 厌食的辨证论治

辨证	症状	治法	方剂	中成药
脾运失健	纳呆，食无味，或拒食，形体尚可，常伴暖气泛恶，胸脘脘痞，大便不调，面色少华，精神正常，舌苔薄白或薄腻，脉尚有力	调和脾胃，透脾开胃	不换金正气散	枳术丸（颗粒）、健儿消食口服液、健脾消食丸
脾胃气虚	不思进食，食而不化，面色萎黄，神倦多汗，大便偏稀夹有不消化食物，面色少华，形体偏瘦，肢倦乏力，舌薄白，脉无力	健脾益气，佐以助运	异功散	参苓白术散（丸），消食片，消食丸、小儿口服液

35. 桑杏汤是治疗咳嗽的常用方剂，其针对的证候是

- A. 风寒犯肺
- B. 风热犯肺
- C. 痰热壅肺
- D. 燥邪伤肺
- E. 肺肾阴虚

【答案】D

【解析】

续表

辨证	症状	治法	方剂	中成药
燥邪伤肺	干咳无痰，或痰少而黏，不易咳出，或痰中带血，并见鼻燥咽干，舌红少津，脉细数	辛凉清润	桑杏汤	二母宁嗽丸、炼川贝枇杷露
痰热壅肺	咳嗽气粗，痰多黄稠，烦热口干，舌红，苔黄腻，脉滑数	清热化痰，肃肺	清金化痰汤	清气化痰丸、鲜竹沥、胆川贝丸、葶苈止咳糖浆
肺肾阴虚	干咳少痰，或痰中带血，午后咳甚，或伴五心烦热，颧红，耳鸣，舌红少苔，脉细数	滋阴润肺，止咳化痰	百合固金汤	二冬膏、肺丸、金水

36. 某女，28岁。妊娠7个月，因饮食不当致胃痛胀满，噎腐恶食，吐食，大便不爽，舌苔厚腻，该患者应忌用的中成药是

- A. 保和丸
- B. 越鞠保和丸
- C. 六味安消散
- D. 胃脘舒颗粒
- E. 胃乃安胶囊

【答案】C

【解析】

第01讲 民族医药基础知识

正保医学教育网
www.med66.com

表4-5 常用藏成药方剂

药物名称	功能	主治病证
五味渣驯丸	清肝热，利胆退黄	用于肝炎、肝肿大
五味麝香丸	清热解毒，凉血消肿	用于血热毒盛，小儿疔疮，疔毒，咽喉肿痛，口舌生疮，牙龈出血，疔腮
六味安消散	和胃健脾，消积导滞，活血止痛	用于脾胃不和，积滞内停所致的脘痛胀满、消化不良、便秘、痛经
七味红花殊胜丸	清热消炎，保肝退黄	用于新旧肝病，巩膜黄染，食欲不振等
八味沉香散	清心热，养心，安神，开窍	用于热病攻心，神昏谵语；冠心病心绞痛
十味黑冰片丸	温胃消食，破积利胆	用于隆病，食积不化，恶心，痞痞瘤，胆囊肿，胆结石及黄疸

37.藏药七味红花殊胜丸的功能是

- A.清热消炎，保肝退黄
- B.清热解毒，疏肝利胆
- C.清热解毒，益肝养胃
- D.清热解毒，调和滋补
- E.清热消炎，通经活络

【答案】A

【解析】

第01讲 民族医药基础知识

正保医学教育网
www.med66.com

表4-5 常用藏成药方剂

药物名称	功能	主治病证
五味渣驯丸	清肝热，利胆退黄	用于肝炎、肝肿大
五味麝香丸	清热解毒，凉血消肿	用于血热毒盛，疔毒，咽喉肿痛，口舌生疮，牙龈出血，疔腮
六味安消散	和胃健脾，消积导滞，活血止痛	用于脾胃不和，积滞内停所致的脘痛胀满、消化不良、便秘、痛经
七味红花殊胜丸	清热消炎，保肝退黄	用于新旧肝病，巩膜黄染，食欲不振等
八味沉香散	清心热，养心，安神，开窍	用于热病攻心，神昏谵语；冠心病心绞痛
十味黑冰片丸	温胃消食，破积利胆	用于隆病，食积不化，恶心，痞痞瘤，胆囊肿，胆结石及黄疸

38.中国古代收方最多，为研究复方用药提供珍贵资料的方书籍是

- A.千金翼方
- B.普济方
- C.外台秘要
- D.太平圣惠方

E. 太平惠民和剂局方

【答案】B

【解析】

第01讲 中医药文献信息与咨询服务

正保医学教育网
www.med66.com

(三) 主要方书典籍
主要方书典籍见表6-3。

表6-3 主要方书典籍

典籍名称	记忆要点
《肘后备急方》	属急症手册性质。
《备急千金要方》	论中风有“凡此风之发也，必由热出”， <u>麻黄汤、独活寄生汤等名方</u> ， <u>《医经原论》</u> 是我国第一部论述
《千金翼方》	唐·孙思邈撰著，是《千金要方》
《外台秘要》	继《千金方》后又一部综合性医
《太平圣惠方》	宋·王怀隐，因证设方，药随方
《太平惠民和剂局方》	宋代官府颁行，我国第一部成药
《普济方》	中国古代收方最多的方书

孙思邈

39. 某女，48岁。平易外感，昨日受凉后发热，恶寒明显，头痛，鼻塞，身痛，体倦，咳嗽，舌质淡，苔薄白，脉浮无力。应选用的方剂是

- A. 银翘散加减
- B. 参苏饮加减
- C. 桑菊饮加减
- D. 麻黄汤加减
- E. 桂枝汤加减

【答案】B

【解析】

第01讲 中医内科病证的辨证论治（一）

正保医学教育网
www.med66.com

续表

辨证	症状	治法	方剂	中成药
时行感冒	突发发热， <u>高热不退</u> ，甚则寒战， <u>周身酸痛</u> ，无汗，咳嗽，口干，咽喉疼痛，伴明显全身症状，呈现流行性发作。舌红，苔黄，脉浮数。	清热解暑	清瘟解毒丸	清开灵颗粒（口服液）、羚羊感冒片、连花清瘟
体虚感冒	发热，恶寒较甚，无汗，头痛鼻塞， <u>身楚倦怠</u> ，咳嗽， <u>咳痰无力</u> ，舌淡，苔白，脉浮无力。	益气解表，宣肺化痰	参苏饮	参苏饮

40. 为使药物中的药效成分充分煎出，又不会造成药效成分消失，需要后下的中药是

- A. 三七
- B. 香薷

- C.砂仁
- D.佩兰
- E.藿香

【答案】C
【解析】

第09讲 中药调剂操作的基本技能知识（三）

正保医学教育网
www.med66.com

(三) 特殊煎药方法

中药的特殊煎药方法见表7-18。

表7-18 中药的特殊煎药方法

煎煮方法	内容
先煎	①矿物、动物骨甲类饮片：生蛤壳、生龙骨、生龙齿、生紫石英、生寒水石、生石膏、生石决明、生珍珠母、生瓦楞子、鳖甲、龟甲、鹿角霜、生磁石、生牡蛎、生赭石、自然铜等 ②有毒饮片：生川乌、生草乌、制附子等
后下	①气味芳香类：降香、沉香、薄荷、砂仁、白豆蔻、鱼腥草等 ②久煎后有效成分易被破坏的饮片：钩藤、桑寄生、黄芩、生大黄、番泻叶等
包煎	①含粘液质较多的饮片：车前子、葶苈子等 ②富含绒毛的饮片：旋覆花、枇杷叶等 ③花粉等微小饮片：蒲黄、海金沙、蛤粉、六一散等

二、配伍选择题

[41~42]

- A.板蓝根与大青叶
- B.阿魏与鸡屎藤
- C.陈皮与青皮
- D.山药与天花粉
- E.麻黄与麻黄根

41.按照斗谱编排基本原则，因植物来源相同但入药部位和功效不同，不能排列在一起的饮片是

42.按照斗谱编排基本原则，因外观形状相似但功效不同，不能排列在一起的饮片是

【答案】ED

【解析】

续表

常见药物	可以一起存放	不可一起存放
山药	泽泻、牡丹皮、 薏苡仁	天花粉
麻黄	桂枝	麻黄根 (同一植物来源, 入药部位不同)
桃仁	红花	杏仁 (外观性状相似, 功效不同)
独活	羌活	当归 (外观性状相似, 功效不同)
知母	浙贝母	玉竹 (外观性状相似, 功效不同)
三棱	莪术	荆三棱与芒硝 (十九畏, 配伍禁忌)

[43~45]

- A. 灯心草煎汤送服
- B. 淡盐水送服
- C. 黄酒送服
- D. 生姜煎汤送服
- E. 蜂蜜冲水送服

43. 九味羌活丸可用的药引和服用方法是

44. 附子理中丸可用的药引和服用方法是

45. 腰痛宁胶囊可用的药引和服用方法是

【答案】DDC

【解析】

(二) 中成药与药引的配伍应用

中成药与药引的配伍应用见表9-2。

表9-2 中成药与药引的配伍应用

药引	作用
酒	活血行经
姜	发表祛凝
大枣	消积开胃
大枣	宁心利心
灯心	发散诸邪
莲实	清心养胃和脾
生姜、大枣煎汤	针对外感风寒或脾胃虚寒之呕吐泄泻等病证, 以增强散风寒、和脾胃之功
黄酒或白酒送服三七粉、云南白药等	针对跌打损伤、风寒湿痹等证, 以行药势, 直达病所
蜂蜜冲水送服麻仁丸	增强麻仁丸润肠和中之效
淡盐水送服六味地黄丸	引药入肾

2. 中成药的用法用量

(1) 中成药的内服(表7-9)

表7-9 中成药的送服药引

药引	药引功效	中成药举例
黄酒	温通经络、活血散瘀	大活络丸、牛黄醒消丸、跌打丸
姜汤	散寒、温胃止呕	藿香正气丸、附子理中丸
淡盐水	引药入肾	六味地黄丸、大补阴丸
焦三仙煎汤	增强消导之功	至宝锭
鲜芦根煎汤	清热透表生津	银翘解毒丸
清茶	清热	川芎茶调散
米汤	保护胃气	四神丸、更衣丸

[46~48]

- A. 四物颗粒
- B. 四神丸
- C. 四君子丸
- D. 龟鹿二仙膏
- E. 六味地黄丸

46. 某女, 31岁。头晕眼花, 面色萎黄, 口唇色淡, 月经量少; 舌质淡, 脉细。医生辨证为虚劳血虚证。应选用的中成药是

47. 某女, 45岁。不耐寒热, 头晕, 乏力, 神疲自汗盗汗; 舌淡少津, 苔薄白, 脉沉细。医生辨证为虚劳阴阳两虚证。应选用的中成药是

48. 某男, 57岁。神疲乏力, 少气懒言, 自汗; 舌质淡, 苔薄白, 脉虚。医生辨证为虚劳气虚证, 应选用的中成药是

【答案】ADC

【解析】

表3-22

虚劳的辨证论治

辨证	症状	治法	方剂	中成药
气虚	神疲乏力, 少气懒言, 声音低微, 头晕, 自汗, 不思饮食, 活动后诸症加重。舌质淡, 或有齿痕, 苔薄白, 脉虚无力	益气补虚	四君子汤	四君子丸、玉屏风颗粒、补中益气丸、参芪口服液
血虚	头晕眼花, 心悸多梦, 手足发麻, 面色萎黄, 口唇、爪甲色淡, 妇女月经量少。舌质淡, 脉细	补血养肝	四物汤	四物颗粒、当归补血口服液、八珍颗粒、十全大补膏(丸)、六味地黄丸、大补阴丸、知柏地黄丸、左归丸、麦味地黄丸
阴虚	形体消瘦, 口燥咽干, 潮热颧红, 五心烦热, 盗汗, 小便短黄, 大便干结。舌质红, 舌面少津, 苔少或无苔, 脉细数	养阴生津	沙参麦冬汤	

续表

辨证	症状	治法	方剂	中成药
阳虚	怕冷，四肢不温，口淡不渴，自汗，小便清长或尿少浮肿，大便溏薄。舌质淡，舌体胖，苔白滑，脉沉迟	补阳温中	附子理中汤	附子理中丸、桂附理中丸、桂附地黄丸、济生肾气丸、四神丸、丸
阴阳两虚	不耐寒热，头晕，神疲乏力，口渴，自汗盗汗，舌质淡，舌面少津，苔白，脉沉细或沉细数	阴阳双补	桂附地黄丸	清宫长、五子衍宗丸、育亨丸

[49~50]

- A.影响吸收
- B.影响代谢
- C.增加排泄
- D.影响分布
- E.减少排泄

49.中西药联用时，麻仁丸与红霉素合用，可发生的药动学相互作用是

50.中西药联用时，女金丹与诺氟沙星合用，可发生的药动学相互作用是

【答案】AD

【解析】

表9-6 中西药联用影响药物透过生物膜的吸收

不适宜的药物联用	不宜联用的原因
含鞣质的中药（如大黄、虎杖、五倍子、石榴皮）、含鞣质的中成药（如生肌解毒片、麻仁丸、七厘散）不宜与红霉素、土的宁、利福平同服	鞣质具有吸附作用，使红霉素的宁、利福平透过生物膜吸收量减少
药物炭（蒲黄炭、荷叶炭、煅瓦楞子）不宜与生物碱、酶制剂同服	药物炭的吸附作用和酶制剂的生物活性的吸收
果胶类药物（六味地黄丸、人参归脾丸、山茱萸等）不宜与林可霉素（洁霉素）同服	可使林可霉素的吸收率下降90%

4. 影响排泄

(1) 增加排泄 (表9-11)

表9-11 中西药联用增加排泄

不适宜的联用	不宜联用原因
碱性中药 (如煅牡蛎、煅龙骨、红灵散、女金丹、痧气散、乌贝散、陈香露白露片等) + 尿酸化药物 (诺氟沙星、味喃妥因、吡哌美辛、头孢类抗生素等) 联用	排泄加快的时间, 低导泻
红霉素不宜与含山楂制剂同服	会降
冰硼散不宜与青霉素和磺胺类药物同服	
有机酸成分的中药 (如乌梅、山茱萸、陈皮、木瓜、川芎、青皮、山楂、女贞子等) 不宜与碱性药物 (如氢氧化铝、氢氧化钙、碳酸钙、枸橼酸镁、碳酸氢钠、氨茶碱、氨基糖苷类抗生素) 同服	

[51~52]

- A. 醋炙品
- B. 清炒品
- C. 生品
- D. 盐炙品
- E. 蜜炙品

某女, 28岁。皮肤出现红色风团, 灼热剧痒, 遇热加剧, 得冷则减, 伴有发热, 恶寒, 咽喉肿痛; 舌红, 苔薄白, 脉浮数。中医诊断为瘾疹, 证属风热犯表, 治以消风散加减, 开具的处方为: 荆芥 9g, 防风 9g, 当归 6g, 地黄 12g, 苦参 6g, 蝉蜕 6g, 牛蒡子 9g, 知母 10g, 石膏 (捣碎、先煎) 30g。

51. 该处方中的知母, 调配时应付

52. 该处方中的牛蒡子, 调配时应付

【答案】DB

【解析】

2. 饮片的处方应付

(1) 常见的处方应付 Δ 净炒必炒

分类	重要考点	记忆技巧
清炒品	(蔓荆、苍耳、牛蒡、白芥、紫苏、莱菔) 子、谷芽、麦芽、王不留行、酸枣仁	芽(丫), 多子, 我不留行子必炒
麸炒品	白术、僵蚕、枳壳	麸炒术蚕壳
炮制品	天南星 (矾制)、何首乌、草乌 (水制)、川乌 (水制)、附子 (炮制)、吴茱萸 (甘草水制)、远志 (甘草水制去心)、厚朴 (姜制)	有毒及药效 (质朴三乌)
烫制品	龟甲、鳖甲、穿山甲	烫三甲

[53~54]

- A.升麻
- B.麦芽
- C.桃仁
- D.麻黄
- E.黄芪

有无证候禁忌是处方审核的一项重要内容。医生为患有高血压、不寐、多汗的病人开具了包含上述中药的处方，执业药师在审核时应告知医生

53.体虚多汗者忌用

54.高血压及失眠患者慎用

【答案】DD

【解析】

第02讲 中药调剂操作的基本技能知识(二)

正保医学教育网
www.med66.com

(4) 证候禁忌 (表7-14)

表7-14 证候禁忌

证候	所忌药物	证候	所忌药物
体虚多汗者	发汗药	体虚多汗者	忌用麻黄
阳虚里寒者	寒凉药	虚喘、高血压及失眠患者	慎用麻黄
阴虚内热者	苦寒清热药	湿盛痰多、小便不利患者	白芷
脾胃虚寒、大便稀溏者	苦寒或泻下药	麻疹已透及阴虚火旺者	升麻
阴虚津亏者	淡渗利湿药	肝功能障碍者	黄药子

[55~57]

- A.胖嫩舌
- B.齿痕舌
- C.瘦薄舌
- D.裂纹舌
- E.芒刺舌

55.阴精亏损，不能荣润，常见的舌形是

56.脾肾阳虚，水饮内停，常见的舌形是

57.脏腑火盛，热邪亢盛，常见的舌形是

【答案】DAE

【解析】

续表

裂纹舌	舌质红绛而有裂纹	热盛津伤, 阴精亏损
	舌色淡白而有裂纹	血虚不润
齿痕舌	舌体的边缘见牙齿的痕迹	多因舌体胖大而受齿缘压迫, 故齿痕舌常与胖大舌同见, 多属脾虚
	舌质淡白而湿润	脾虚而寒湿壅盛
芒刺舌	芒刺干燥	多属热邪亢盛, 且热愈盛, 芒刺愈多
	舌尖有芒刺	心火亢盛
	舌边有芒刺	肝胆火盛
	舌中有芒刺	胃肠热盛

2. 望舌形 (表2 - 10)

表2 - 10 望舌形

荣枯舌	荣舌 舌体明润	津液充足
	枯舌 舌体干瘪	津液已伤
老嫩舌	老舌 形色坚敛苍老	实证、热证
	嫩舌 纹理细腻, 形色浮胖娇嫩	虚证、寒证
胖大舌	胖嫩舌 舌体胖嫩, 色淡	脾肾阳虚, 津液停滞
	肿胀舌 舌体肿胀满口, 色深红	心脾热盛
瘦薄舌	胖肿舌 色青紫而暗	中毒
	瘦薄而色淡	气血两虚
	瘦薄而色红绛且干	阴虚火旺、津液耗伤

续表

裂纹舌	舌质红绛而有裂纹	热盛津伤, 阴精亏损
	舌色淡白而有裂纹	血虚不润
齿痕舌	舌体的边缘见牙齿的痕迹	多因舌体胖大而受齿缘压迫, 故齿痕舌常与胖大舌同见, 多属脾虚
	舌质淡白而湿润	脾虚而寒湿壅盛
芒刺舌	芒刺干燥	多属热邪亢盛, 且热愈盛, 芒刺愈多
	舌尖有芒刺	心火亢盛
	舌边有芒刺	肝胆火盛
	舌中有芒刺	胃肠热盛

[58~60]

- A. 导致精子产生和成熟发生障碍，抑制女性患者的卵巢功能
- B. 恶心呕吐，腹痛腹泻，重者可见黄疸、肝肿大、消化道出血
- C. 直接作用于中枢神经系统，甚或因呼吸中枢完全麻痹而致死
- D. 血小板、白细胞、血红蛋白减少，并可发生急性粒细胞减少
- E. 心律失常，如心率减慢、早搏、房室传导阻滞

58. 苍耳子的主要不良反应是

59. 香加皮的主要不良反应是

60. 细辛的主要不良反应是

【答案】BEC

【解析】

第02讲 中药不良反应(二) 正保医学教育网 www.med66.com

表11-20 苍耳子的不良反应及中毒解救

药物	具体内容
不良反应	①消化系统：恶心、呕吐、腹痛、腹泻，重者可见黄疸、肝肿大、消化道出血；②神经系统：头痛、头晕；③循环系统：胸闷、心慌气短、血压下降、心律失常、房室传导阻滞；④呼吸系统：呼吸困难、呼吸节律不整、肺水肿；⑤泌尿系统：水肿、少尿、尿闭、血尿、尿失禁、肾功能异常、急性肾功能衰竭；⑥血小板减少性紫癜、神经性水肿、声哑、喉头水肿、喉梗塞
中毒解救	①无胃肠道出血时，可催吐，用1:5000高锰酸钾液洗胃，内服硫酸镁导泻，若服大量超过4小时者，应及时用10%硫酸钠水作高位灌肠；②静脉滴注5%葡萄糖氯化钠注射液，并大量饮糖水。有心力衰竭、肺水肿及尿闭者应限制输液量；③出血时给以维生素K等止血剂，必要时输血；④肝脏明显损害时，可给糖皮质激素及维生素B ₁ 、B ₁₂ 、C等保肝药物

第02讲 中药不良反应(二) 正保医学教育网 www.med66.com

表11-10 香加皮的不良反应及中毒解救

药物	具体内容
不良反应	①消化系统：恶心、呕吐、腹泻等胃肠道症状；②心血管系统：心律失常，并且香加皮中毒后多表现为血压升而后下降、心肌收缩力增强、每分钟心输出量增加，后期心输出量减弱、心律不齐，乃至心肌纤颤而死亡
中毒解救	①甘草15g、绿豆30g，水煎服；②心律失常时，干姜6g、附子12g、甘草6g、葱白10g，水煎服。每2~4小时服1次。禁用钙剂、拟肾上腺素药；③心跳过缓时注射阿托品0.5~1mg，必要时重复注射；④呼吸困难时，可用山梗菜碱、尼可刹米

(十) 细辛

细辛的不良反应及中毒解救见表11-19。

表11-19 细辛的不良反应及中毒解救

药物	具体内容
不良反应	细辛中的挥发油直接作用于中枢神经系统，最终因呼吸中枢完全麻痹而死亡
中毒解救	①中毒后立即催吐，1:4000高锰酸钾洗胃，服用果汁或通用解毒剂，静脉输液内加维生素C ②有惊厥、痉挛等症时，可给安定或安宫牛黄丸 ③尿闭时进行导尿或口服氢氯噻嗪

[61~63]

- A. 培元通脑胶囊
- B. 消栓胶囊
- C. 逐瘀通脉胶囊
- D. 银杏叶片
- E. 麝香保心丸

由于老年人的靶器官或细胞的敏感性增强，尤其是对中枢神经抑制药物、降血糖药物、心血管系统药物反应特别敏感，在正常剂量下的不良反应增加，甚至出现药源性疾病，因此在联合用药中应高度重视。

- 61. 老年人使用法莫替丁时，应避免联用
- 62. 老年人在服用地高辛时，应避免联用
- 63. 患有心脑血管疾病的老年糖尿病患者使用二甲双胍降糖时，应避免联用

【答案】DEA

【解析】

表10-3 老年人不宜联合用药的举例

效果	联用药物	联用机理	联用
功效累加	麝香保心丸+地高辛等强心苷类药物	麝香保心丸所含甾体的化学结构与强心苷类似，联用后，会发生强心作用的累加	诱发强心
影响疗效	银杏叶制剂+法莫替丁片	法莫替丁片为抗溃疡抗酸药，与含多量黄酮类成分的银杏叶制剂同时服用产生络合效应，形成螯合物，影响疗效	抗酸类西药避免含黄酮类的中药复方丹参片、丹参滴丸、银杏叶片同用

续表

效果	联用药物	联用机理	结果
降糖效果降低	含甘草、人参、鹿茸等成分的中成药如倍元通脑胶囊、益心通脉颗粒、活血通脉片+降糖药二甲双胍、消渴丸、阿卡波糖、胰岛素等	甘草、人参、鹿茸具有糖皮质激素样作用，与降糖药产生拮抗作用	降低
加重不良反应	甘草、鹿茸+阿司匹林	甘草、鹿茸具有糖皮质激素样作用，与阿司匹林合用	

[64~65]

- A. 固冲汤加减
- B. 逍遥散加减
- C. 调肝汤加减
- D. 内补丸加减
- E. 固阴煎加减

64. 某女，40岁。月经非时而下，量多如崩，色淡质稀，神疲体倦，面色萎黄；舌质淡，舌体胖，苔薄白，脉弱。应选用的方剂是

65. 某女，21岁。月经先期，量少，色淡质稀，腰膝酸软，头晕耳鸣，小便频数；舌质暗淡，苔薄白，脉沉细。应选用的方剂是

【答案】AE

【解析】

表3-33

崩漏的辨证论治

辨证	症状	治法	方剂	中成药
气血两虚	经血非时而下，量多如崩，或淋漓不断，色淡质稀，神疲体倦，气少懒言，面色无华，唇舌色淡，苔薄白，脉细弱	补血益气止血	圣愈汤合血安胶囊	定坤丹（主治两虚、气滞血证）、同仁乌鸡凤口服液、乌鸡凤丸等
脾不统血	经血非时而下，量多如崩，或淋漓不断，色淡质稀，神疲体倦，气短懒言，不思饮食，四肢不温，或面浮肢肿，面黄，舌淡胖，苔薄白，脉缓弱	健脾益气，固冲止血	固冲汤	人参归脾丸、女科调经丸、女科调经膏（主治气血两虚、瘀证）

E.萆澄茄

68.按照对抗贮存法，宜与牡丹皮同贮的是

69.按照对抗贮存法，宜与吴茱萸同贮的是

【答案】DB

【解析】

第01讲 中药的贮藏与养护

正保医学教育网
www.med66.com

续表

传统养护技术	具体内容
高温养护法	温度一般高于40℃，但必须注意的是，含挥发油的饮片烘烤时温度不宜超过60℃，以免影响饮片的质量
对抗贮存法	采用两种或两种以上药物同贮，相互克制起到防止虫蛀、霉变的养护方法。一般适用于数量不多的药物。如牡丹皮与泽泻、山药同贮，蛤蚧与花椒、吴茱萸或萆澄茄同贮，蕲蛇或白花蛇与花椒或大蒜瓣同贮，土鳖虫与大蒜同贮，人参与细辛同贮，冰片与灯心草同贮，硼砂与绿豆同贮，藏红花与冬虫夏草同贮等。还可采用与具有特殊气味的物质密封同贮，如山苍子油、花椒、樟脑、大蒜、白酒等，有时也可达到良好的防蛀、防霉效果



[70~72]

A.先煎

B.包煎

C.另煎

D.后下

E.兑服

某男，60岁。半身不遂，患侧僵硬拘挛，头晕头痛，面赤耳鸣，舌红，苔薄黄，脉弦。中医辨证为肝阳上亢，治以天麻钩藤饮加减，药用天麻，钩藤，石决明，牛膝，桑寄生，栀子，黄芩，益母草，茯神，竹沥。执业药师发药时，需向患者交待正确的煎药和服用方法

70.处方中竹沥应采用的是

71.处方中的石决明应采用的是

72.处方中的钩藤应采用的是

【答案】EAD

【解析】

续表

煎煮方法	内容
溶化	将药物置于已...中加热溶化后一起服用。也可将此类...置于容器内...加热溶化或隔水炖化后,再对入群...中混匀分...鳖甲胶、鹿角胶、龟鹿二仙胶等
另煎	一些贵重...充分煎出,减少其成分被其他...药渣吸附引起...器单独煎煮取汁后,再将渣并...入其他群药合...煎煮的不同药液混匀后分服。如...人参、西洋参...角、水牛角等
兑服	对于液体中药...煎煮,往往会影响其成分,故应...待其他药物...再行兑入服用。如黄酒、竹沥水、鲜藕汁、姜...

(三) 特殊煎药方法

中药的特殊煎药方法见表7-18。

表7-18 中药的特殊煎药方法

煎煮方法	内容
先煎	①矿物、动物骨甲类饮片：生蛤壳、生龙骨、生龙齿、生石膏、生寒水石、生石膏、生石决明、生珍珠母、生瓦楞子、生牡蛎、生鳖甲、生龟甲、生鹿角霜、生磁石、生牡蛎、生赭石、自然铜、生石决明、生珍珠母、生瓦楞子、生牡蛎、生鳖甲、生龟甲、生鹿角霜、生磁石、生牡蛎、生赭石、自然铜等 ②有毒饮片：生川乌、生草乌、制附子等
后下	①气味芳香类：降香、沉香、薄荷、砂仁、白豆蔻、木香、檀香、丁香、佛手、香橼、橘红、化橘红、枳壳、枳实、佛手、香橼、橘红、化橘红、枳壳、枳实等 ②久煎后有效成分易被破坏的饮片：钩藤、苦杏仁、茵陈、生大黄、番泻叶等
包煎	①含粘液质较多的饮片：车前子、葶苈子等 ②富含油脂的饮片：旋覆花、枇杷叶等 ③花粉等微小饮片：蒲黄、滑石粉、蛤粉、六一散等

[73~74]

- A.涂膜剂
- B.气雾剂
- C.贴膏剂
- D.凝胶剂
- E.流浸膏剂

中成药因剂型不同,采用的贮存养护方法也不同。

73.除另有规定外,应避光,密闭贮存,并应防冻的中成药剂型是

74.除另有规定外,应置遮光容器内密封和阴凉处贮存的中成药剂型是

【答案】DE

【解析】

[75~76]

- A.肝主藏血
- B.肝主疏泄
- C.脾主统血
- D.心主血脉



E.肺朝百脉

75.具有促进血液运行，调畅情志活动等生理功能的是

76.具有推动血液运行，主宰精神活动等生理能的是

【答案】BD

【解析】



[77~79]

A.腹泻肠鸣，粪便臭如败卵，夹有不消化食物

B.黎明之前，肠鸣腹痛，泻后则安，腰膝酸软

C.泄泻腹痛，粪色黄褐，肛门灼热，烦热口渴

D.大便溏泻，水谷不化，面色萎黄，食少倦怠

E.紧张之时，腹痛欲便，便后痛减，时时叹息

77.脾胃虚弱泄泻的临床特点是

78.脾肾阳虚泄泻的临床特点是

79.食滞胃肠泄泻的临床特点是

【答案】DBA

【解析】

第03讲 中医内科病证的辨证论治(二)

正保医学教育网
www.med66.com

续表

辨证	症状	治法	方剂	中成药
脾胃气虚	大便时溏时泻，水谷不化，迁延反复，食少，食后脘闷不适，稍进油腻之物，则便次明显增多，面色萎黄，肢倦乏力，舌质淡，苔厚白，脉细弱。	健脾益气化湿止泻	参苓白术散	开胃健脾丸、参苓白术散、健脾胃、涩肠止泻散
脾肾阳虚	黎明之前，脐腹作痛，肠鸣即泻，泻后则安，腹部喜温，形寒肢冷，腰膝酸软，舌淡苔白，脉沉细。	温肾健脾，固涩止泻	四神丸	四神丸、固本益肠片

→ 五更泄

↓ 收涩之本

第03讲 中医内科病证的辨证论治(二)

正保医学教育网
www.med66.com

表3-11 泄泻的辨证论治

辨证	症状	治法	方剂	药
食伤肠胃	腹痛肠鸣，泻下粪便臭如败卵，泻后痛减，泻下伴有不消化食物，脘腹胀满，嗳腐吞酸，不思饮食。舌苔垢浊或厚腻，脉滑。	消食导滞	保和丸	加味保和丸
湿热内蕴	泄泻腹痛，泻下急迫，或泻而不爽，粪色黄褐，气味臭秽，肛门灼热，小便短黄，烦热口渴。舌质红，苔黄腻，脉滑数。	清热利湿	葛根芩连汤	

[80~82]

- A. 蟾酥
- B. 白降丹
- C. 生千金子
- D. 雄黄
- E. 生马钱子

毒性中药系指毒性剧烈，治疗剂量与中毒剂量相近，使用不当会致人中毒或死亡的中药。因此执业药师在审核或调剂时含有特殊管理毒性中药的处方时，掌握其用量非常重要。

80. 仅供外用的毒性中药是

81. 内服，用量 0.05~0.1g，入丸散用的毒性中药是

82. 内服，用量 0.3~0.6g，炮制后入丸散用的毒性中药是

【答案】BDE

【解析】

续表

名称	用法用量	注意事项
白降丹	外用适量	不可内服,具腐蚀性
生草乌	炮制后用	生品内服宜慎,孕妇禁用,注意“半蒺贝”及“攻乌”禁忌
生川乌	炮制后用	生品内服宜慎,孕妇禁用,注意“半蒺贝”及“攻乌”禁忌
生附子	3~15g	孕妇慎用,注意“半蒺贝”
生白附子	3~6g	生品内服宜慎,孕妇慎用
生半夏	炮制后用	不宜与乌头类药材同用,
生巴豆	外用适量	不宜与牵牛子同用,孕妇

表7-19 重点毒性中药品种的用法用量

名称	用法用量	注意事项
闹羊花	0.6~1.5g	不宜多服、久服,体虚者及孕妇禁用
洋金花	0.3~0.6g	孕妇、外感及痰热咳喘、青光眼、高血压及心动过速患者禁用
斑蝥	0.03~0.06g	内服慎用,孕妇禁用
雄黄	0.05~0.1g	内服宜慎,不可久用,孕妇禁用
蟾酥	0.015~0.03g	孕妇慎用
砒石	0.002~0.004g	毒性大,用时宜慎,不宜与水牛角同煎及孕妇忌服

续表

名称	用法用量	注意事项
生千金子	1~2g	孕妇禁用
生甘遂	0.5~1.5g	不宜与甘草同用,孕妇禁用
生狼毒	熬膏外敷	不宜与密陀僧同用
生藤黄	0.3~0.6g	内服慎用
天仙子	0.06~0.6g	心脏病、心动过速、青光眼患者及孕妇
生马钱子	0.3~0.6g	不宜生用;不宜多服久服;运动员慎用;宜大面积涂敷
生天南星	外用适量	生品宜慎,孕妇慎用

[83~85]

- A.柴胡疏肝散加减
- B.黄芪建中汤加减
- C.良附丸加减
- D.左金丸加减
- E.保和丸加减

83.某女, 36岁。胃脘胀痛, 连及肋助, 善太息, 生气后症状加重, 食欲不振; 舌质红, 苔薄白, 脉弦。应选用的方剂是

84.某男, 21岁。胃痛胀满, 噎腐恶食, 大便不爽; 舌质红, 苔厚腻, 脉滑。应选用的方剂是

85.某男, 33岁。胃痛暴作, 喜温恶寒, 得温痛减, 日和不渴; 舌质淡, 苔薄白, 脉弦紧。应选用的方剂是

【答案】AEC

【解析】

第03讲 中医内科病证的辨证论治(二) 正保医学教育网
www.med66.com

续表

辨证	症状	治法	方剂	中成药
肝胃不和	胃脘胀痛, 连及肋助, 嗝气后疼痛减轻, 生气时胃痛加重, 食欲不振, 或见嘈杂吞酸, 舌红, 苔薄白, 脉弦	舒肝理气, 和胃止痛	柴胡疏肝散	气滞胃痛颗粒、柴胡舒肝丸、舒肝和胃丸、沉香化气丸
肝胃郁热	胃脘灼痛, 痛势急迫, 烦躁易怒, 泛酸嘈杂, 口干口苦, 舌红苔黄, 脉弦或数	疏肝泄热, 和胃止痛	丹栀逍遥散合左金丸	加味左金丸、左金丸、逆康胶囊

第03讲 中医内科病证的辨证论治(二) 正保医学教育网
www.med66.com

表3-10 胃痛的辨证论治

辨证	症状	治法	方剂	中
寒凝气滞	胃痛暴作, 喜温恶寒, 得温痛减, 口和不渴, 或吐清水, 舌淡, 苔薄白, 脉弦紧	温中散寒, 和胃止痛	良附丸	良附丸
饮食停滞	胃痛胀满, 噎腐恶食, 或吐不消化食物, 吐食或矢气后痛减, 或大便不爽, 舌苔厚腻, 脉滑	导滞和胃	保和丸	保和丸、加味保和丸、六神散、沉香开胃山楂散

[86~87]

- A. 气血两虚证
- B. 气随血脱证
- C. 气滞血瘀证
- D. 气虚血瘀证
- E. 气不摄血证

86. 患儿 8 岁。倦怠乏力，食少纳呆，气短懒言，面色苍白，皮下出血色淡，舌淡，脉软弱细微。中医辨证是

87. 某男，47 岁。急性胃出血，面白，四肢厥冷，少气懒言，大汗淋漓，舌淡，脉微细。中医辨证是

【答案】EB

【解析】

第 06 讲 中医诊断基础 (六)

正保医学教育网
www.med66.com

(三) 气血同病常见证候的临床表现及辨证要点 (1+1=2)

气血同病常见证候的临床表现及辨证要点见下表

表 2-58 气血同病常见证候的临床表现及辨证要点

证型	临床表现	辨证要点
气滞血瘀	胸胁胀满走窜疼痛(气滞)，性情急躁，并兼见痞块刺痛拒按，舌紫暗或有瘀斑等(血瘀)。妇女还可见月经闭止，或痛经、经色紫暗有块(血瘀)，乳房胀痛(气滞)	病程较长和肝经循行部位的疼痛痞块
气血两虚	少气懒言，乏力自汗(气虚)，面色苍白或萎黄(血虚)，心悸失眠，舌淡而嫩，脉细弱	气虚与血虚的症状同见
气不摄血	出血的同时，见有气短，倦怠乏力，面色苍白，脉软弱细微、舌淡等气虚的症状	出血和气虚症状同见
气随血脱	大量出血的同时，见面色苍白，四肢厥冷，大汗淋漓，甚至晕厥，脉微细或弱	大量出血时，随即出现气脱的症状

[88~90]

- A. 纳食减少，食后作胀，肢体浮肿，大便溏泻
- B. 纳食减少，脘腹胀满，头重身倦，便溏稀薄
- C. 纳食减少，食后作胀，少腹下坠，内脏下垂
- D. 纳食减少，腹中冷痛，口泛清水，四肢不温
- E. 纳食减少，脘腹胀满，黄疸鲜明，发热口苦

88. 脾失健运证，常见的临床表现是

89. 脾阳虚证，常见的临床表现是

90. 寒湿困脾证，常见的临床表现是

【答案】ADB

【解析】

表2-51 脾病主要证候的临床表现及辨证要点

证型	病机	临床表现	辨证要点
脾失健运		食纳减少, 食后作胀, 或肢体浮肿, 小便不利, 或大便溏泻, 时息时发。并伴有身倦无力, 气短懒言, 面色萎黄, 舌质淡嫩, 苔白, 脉缓弱	运化功能减退, 虚证共见
脾气虚	脾虚下陷	子宫脱垂, 脱肛, 胃下垂, 慢性腹泻, 并见食纳减少, 食后作胀, 少腹下坠, 体倦少气, 气短懒言, 面色萎黄, 舌淡苔白, 脉虚	脾气虚和
脾不统血		面色苍白或萎黄, 饮食减少, 倦怠无力, 气短, 肌衄, 便血以及妇女月经过多, 或崩漏, 舌质淡, 脉细弱	脾气虚和血共见

续表

证型	临床表现	辨证要点
脾阳虚	在脾失健运症状的基础上, 同时出现腹中冷痛, 腹满时减, 得温则舒, 口泛清水, 四肢不温, 气怯形寒, 脉沉迟而舌淡苔白。妇女则见白带清稀, 小腹下坠, 腰酸沉等症	脾失健运, 虚寒证共见
寒湿困脾	脘腹胀满, 头身困重, 食纳减少, 泛恶欲吐, 口不渴, 便溏稀薄, 小便不利, 妇女带下。舌苔白腻或厚, 脉迟缓而濡	
脾胃湿热	面目皮肤发黄, 鲜明如橘色, 脘腹胀满, 不思饮食, 厌恶油腻, 恶心呕吐, 体倦身重, 发热, 口苦, 尿少而黄。舌苔黄腻, 脉濡数	

三、综合分析选择题

[91~94]

某女, 49岁, 经血非时而下, 出血量多, 淋漓不尽, 色淡质稀, 两目干涩, 腰膝酸软, 面色晦暗; 舌淡暗, 脉沉弱。

91. 根据临床表现, 该患者的中医辨证是

- A. 气血两虚
- B. 肝肾不足
- C. 脾不统血
- D. 瘀血阻络
- E. 阴虚火旺

【答案】B

【解析】

92. 根据辨证结果, 应选用的治法是

- A. 补益肝肾, 固冲止血

- B.益气补血，化瘀止血
- C.健脾益气，固冲止血
- D.活血化瘀，温经止血
- E.滋肾降火，育阴止血

【答案】A

【解析】

93.根据治法，宜选用的方剂是

- A.健固汤加减
- B.调肝汤加减
- C.丹栀逍遥散加减
- D.归脾汤加减
- E.逐瘀止崩汤加减

【答案】B

【解析】

94.患者服用一段时间后，症状好转，血量减少，要求改服中成药，应选用的中成药是

- A.定坤丹
- B.乌鸡白凤丸
- C.女金丸
- D.安坤赞育丸
- E.坤宁丸

【答案】D

【解析】

第06讲 中医妇科、儿科及耳鼻喉科疾病的辨证论治

正保医学教育网
www.med66.com

续表

辨证	症状	治法	方剂	中成药
肝肾不足	经血非时而下，出血量多，淋漓不尽，色淡质稀，两目干涩，腰酸膝软，面色晦暗，舌淡暗，苔薄白，脉沉弱	补益肝肾，固冲止血	调肝汤	鹿角胶颗粒、安坤赞育丸（主治气血两虚、肝肾不足证）、妇科止血灵（主治肾阴不足）等
瘀血阻络	经血非时而下，量多或少，淋漓不净，血色紫黯有块，小腹疼痛拒按，舌紫暗或有瘀点，脉涩或弦涩有力	活血祛瘀，温经止血	逐瘀止崩汤	坤灵丸（主治气血不足、肾亏宫冷、瘀血内阻证）、少腹逐瘀丸（颗粒）

[95~97]

[98~99]

某男，85岁。动作迟缓，健忘恍惚，腰膝酸软，头晕耳鸣，齿摇发脱，舌淡红，苔白，脉沉无力。

98.根据临床表现，该患者的主要病位是

- A.脑

- B.肾
- C.心
- D.肝
- E.脾

【答案】B

【解析】

第04讲 藏象

正保医学教育网
www.med66.com

四、五脏与志、液、体、华、窍的关系

五脏与志、液、体、华、窍的关系见表1-16。

表1-16 五脏与志、液、体、华、窍的关系

五脏	志	液	体	华	窍
肝	怒	泪	筋	爪	目
心	喜	汗	脉	面	舌
脾	思	涎	肉	唇	口
肺	悲(忧)	涕	皮	毛	鼻
肾	恐	唾	骨	发	耳

第04讲 藏象

正保医学教育网
www.med66.com

独家记忆

- “爪为筋之余”、“齿为骨之余”、“发为肾之余”。
- “五轮学说”把眼睛各部分与五藏相属，如：瞳人属肾；两眦血络为血轮——属心；上下眼睑为肉轮——属脾；白睛为气轮——属肺；瞳孔为水轮——属肾。

99.根据辨证要点分析，该患者的证候是

- A.肾精不足
- B.脑髓亏虚
- C.心肝两虚
- D.心肝血虚
- E.脾气不足

【答案】A

【解析】

续表

证型	临床表现	辨证要点
肾精不足	男子精少不育, 女子经闭不孕, 性功能减退。小儿发育迟缓, 身材矮小, 智力和动作迟钝, 囟门迟闭, 骨骼痿软。成人早衰, 发脱齿摇, 耳鸣耳聋, 健忘恍惚, 动作迟缓, 足痿无力, 精神呆钝	小儿生长发育迟缓, 早衰, 生殖功能减退
肾气不固	滑精早泄, 尿后余沥, 小便频数而清, 甚则不禁, 腰脊酸软, 面色淡白, 听力减退, 舌淡苔白, 脉细弱	肾及膀胱
肾不纳气	气虚喘促, 呼多吸少, 动则喘甚, 汗出, 四肢不温, 恶寒风, 面部虚浮, 脉虚浮, 舌质淡	呼多吸少型症状

[100~102]

某男, 55岁, 有糖尿病史, 口渴引饮, 能食与便溏并见, 精神不振, 四肢乏力; 舌质淡, 苔薄白, 脉细弱

100. 根据临床表现, 该患者的中医辨证是

- A. 胃火炽盛
- B. 肾阴亏虚
- C. 阴阳两盛
- D. 脾胃气虚
- E. 肝火上扰

【答案】D

【解析】

101. 根据辨证结果, 应采用的治法是

- A. 清胃泻火
- B. 滋养肾阴
- C. 健脾益气
- D. 清肝泻火
- E. 阴阳双补

【答案】C

【解析】

102. 根据治法, 应用的方剂是

- A. 参苓白术丸加减
- B. 金匱肾气丸加减
- C. 白虎汤加减
- D. 杞菊地黄丸加减
- E. 龙胆泻肝丸加减

【答案】A

【解析】

表3-17

消渴的辨证论治

辨证	症状	治法	方剂	中成药
阴虚 燥热	烦渴引饮, 消谷善饥, 小便频数而多, 尿浑而黄, 形体消瘦, 舌红苔薄黄, 脉滑数	养阴 润燥	玉女煎	消渴平片(主治阴虚燥热、气阴两虚证)、清胃黄连丸、合六味地黄丸
脾胃 气虚	口渴引饮, 能食与便溏并见, 或饮食减少, 精神不振, 四肢乏力, 舌淡, 苔薄白而干, 脉细弱无力	健脾 益气	参苓白术散	参苓白术散、人参健脾丸

[103~104]

某男, 64岁。因多饮, 多食多尿, 体重减轻3年余就诊。3年来患者无明显诱因出现烦渴引饮, 消谷善饥, 小便频数而量多, 尿液浑浊而黄, 大便干燥秘结, 舌红, 苔薄黄, 脉滑数。平素嗜好肥甘厚味, 长期饮酒, 每天白酒半斤, 运动量少, 体重从100Kg下降至80Kg, 查空腹血糖9.0mmo/L, 西医诊断为糖尿病, 中医诊断为消渴病, 辨证为阴虚燥热症, 处方如下: 中药汤剂为玉女煎加味: 煅石膏30g, 熟地黄20g, 麦冬15g, 知母10g, 怀牛膝10g, 天花粉15g, 共5剂, 水煎服, 每日一剂, 早、晚分服。

西药: 盐酸二甲双胍片 500mg*20片, 500mg/次, 3次/日

中成药: 清胃黄连丸 9g*10丸, 1丸/次, 2次/日

103. 执业药师审核处方时, 应指出玉女煎加味处方存在的问题是

- A. 煅石膏应是生石膏
- B. 熟地黄应是生地黄
- C. 麦冬应是天冬
- D. 怀牛膝应是川牛膝
- E. 知母应是浙贝母

【答案】A

【解析】

104. 执业药师对该患者进行用药指导时, 用药建议错误的是

- A. 中药汤剂与西药隔开30分钟以上服用
- B. 应戒酒, 以免影响盐酸二甲双胍的疗效
- C. 清胃黄连丸为蜜丸, 宜改用清胃黄连片
- D. 盐酸二甲双胍片与清胃黄连丸同时服用
- E. 清胃黄连丸苦寒伤胃, 不可过量或久服

【答案】D

【解析】

[105~106]

某男, 78岁, 既往高血压病10余年, 3年前患者晨起锻炼时出现右上肢麻木不仁, 继则活动不利, 后发展至右下肢乏力, 活动不利, 摔倒在地, 送至医院, 经治好转出院。现症见: 半身不遂, 偏身麻木, 言语謇涩, 伴头晕头痛, 肢体震颤, 面赤耳鸣, 腰酸, 纳差, 夜

寐不安，多梦，小便频数，偏黄，夜尿3次，大便偏干，每4天1次；舌质红，苔薄黄，脉弦长有力，尺脉沉。

4月10日检查：ALT35U/L，AST35U/L， γ -GT45U/L，ALP89U/L，Cr 160 μ mol/L，BUN8.5 μ mol/L；头颅核磁显示：左侧基底节区多发梗塞灶。

西医诊断为1.脑卒中；2.高血压病；3.帕金森综合征；中医辨病为中风，辨证为肝肾阴虚，肝阳上亢。

临床用药如下：

用药日期	药物名称	规格	用量	用法
3月2日至今	苯磺酸氨氯地平	5mg/片	5mg/次	qd.po
3月2日至今	左旋多巴/苄丝肼	100mg/25mg/片	1片/次	tid.po
3月2日至今	阿司匹林肠溶片	100mg/片	100mg/次	qd.po
3月2日至今	阿托伐他汀钙	10mg/片	10mg/次	qn.po

4月12日开始服用中药汤剂，处方为：怀牛膝15g，生龙骨（捣碎，先煎）30g，生牡蛎（捣碎，先煎）30g，生白芍20g，天冬15g，生麦芽15g，代赭石（捣碎，先煎）30g，茯神10g，制首乌30g，玄参15g，石菖蒲10g，远志6g，地龙10g，甘草6g。共14剂，水煎服，每日1剂，早、晚分服。

105.患者服中药汤剂14剂后出现恶心，纳差，乏力，肝功能检查显示：ALT 105U/L，AST 85U/L， γ -GT 85U/L，ALP85U/L。执业药师结合中药处方，分析导致此问题的可疑中药是

- A.生龙骨
- B.制首乌
- C.茯苓
- D.地龙
- E.石菖蒲

【答案】B

【解析】

第11讲 中药不良反应（一）

正保医学教育网 www.med66.com

表11-5 乌头类药物的中毒反应和基本救治原则

名称	具体内容
含乌头的中药材	川乌、草乌、附子、雪上一枝蒿等
中成药	追风丸、追风透骨丸、七伤药片、附子理中丸、金匮肾气丸、天麻丸、小金丹、风湿骨痛胶囊、祛风止痛片、祛风舒筋丸、正骨丸等
中毒机理	主要有毒成分 乌头碱，中毒量为0.2mg，致死量为2~4mg
中毒表现	神经系统 口舌、四肢及全身麻木、头痛、头晕、精神恍惚或小便失禁，继而四肢抽搐、牙关紧闭、呼吸
	循环系统 心悸气短、心律失常、血压下降、面色苍白、四肢厥冷等
	消化系统 流涎、恶心、呕吐、腹痛、腹泻、肠鸣音亢进


106.患者停药汤药后开始服脑立清，3天后出现肢体震颤加重，肌张力增高，分析该患者用药存在的问题是

- A.脑立清中含有冰片、薄荷脑可能减弱左旋多巴/苄丝肼的效应

- B.脑立清中含有珍珠母、赭石可能减弱左旋多巴/苄丝肼的效应
 C.脑立清中含有薄荷脑、猪胆汁可能减弱左旋多巴/苄丝肼的效应
 D.脑立清中含有熟酒曲、酒曲可能减弱左旋多巴/苄丝肼的效应
 E.脑立清中含有清半夏、生藤可能减弱左旋多巴/苄丝肼的效应

【答案】B

【解析】



[107~110]

某女，51岁。因反复胸闷、胸痛2年余就诊。2年前因琐事与人争吵后，出现左前胸胀痛，伴胸肋胀闷，心悸，休息后缓解，未予重视。此后，胸闷胸痛反复发作，多于情绪波动后症状加重，严重时放射至左后肩。患者情志抑郁，善太息，纳差，寐欠安，小便黄，大便稠，唇色紫暗，脉弦涩。既往有慢性乙型肝炎10余年，对酒精过敏。临床给予血脂谱、肝肾功能、心肌酶谱、心电图及平板运动试验等检查，西医诊断为冠心病心绞痛，中医诊断为胸痹，辨证为气滞血瘀证，处方如下：

中药汤剂：柴胡10g，赤芍10g，炒枳壳10g，生甘草10g，桃仁10g，红花9g，生地黄15g，川牛膝10g，当归9g，党参15g，炙乳没（各）6g，桔梗9g，川楝子15g，延胡索粉（分冲）3g。共5剂，水煎服，每日1剂，早、晚分服。

中成药：血府逐瘀口服液10ml×12支，10ml/次，3次/日

复方丹参滴丸25mg×100丸，10丸/次，3次/日

速效救心丸40mg×100丸，舌下含服10粒，必要时服用

茵栀黄口服液10ml×10支，10ml/次，3次/日

107.执业药师在审核该患者的中药饮片处方时，应指出处方存在的问题是

- A.党参与赤芍属配伍禁忌
 B.生地黄的每日剂量超量
 C.川楝子的每日剂量超量
 D.延胡索粉脚注错误
 E.炙乳没应是炙乳香

【答案】C

【解析】

108.对上述处方用药的合理性分析，正确的是

- A. 汤剂与复方丹参滴丸同时服用，属于重复用药
- B. 汤剂与血府逐瘀口服液同时服用，属于重复用药
- C. 汤剂与速效救心丸同时服用，属于重复用药
- D. 汤剂与茵栀黄口服液同时服用，属于重复用药
- E. 复方丹参滴丸与茵栀黄口服液同时服用，属于重复用药

【答案】B

【解析】

109. 执业药师给该患者发放药品的用药交待，正确的是

- A. 中药汤剂每日 1 剂，每剂煎煮 2 次，每次服用 400 毫升
- B. 所服汤剂及成药中含赤芍、生地黄、冰片等寒凉之品，服药期间应忌食生冷
- C. 中药汤剂对胃肠有轻微刺激，应在早、晚餐前服用
- D. 复方丹参滴丸必须舌下含服，每次 10 丸，每日 3 次
- E. 速效救心丸应舌下含服，每次 10 丸，每日 3 次

【答案】B

【解析】

110. 该患者在服用中药治疗的第 2 天，胃脘部不适加重，并伴恶心呕吐症状，执业药师对此种现象的分析，最恰当的是

- A. 所服中药汤剂中含有红花，可能造成消化道刺激
- B. 所服中成药中含有丹参，可能存在消化道刺激
- C. 所服血府逐瘀口服液中含有酒精，可能存在消化道刺激
- D. 所服中药汤剂中含有炙乳没，可能存在消化道刺激
- E. 所服中药延胡索应该煮后再入药，可避免消化道刺激

【答案】B

【解析】

四、多项选择题

111. 某男，63 岁，痹证日久不愈，肢体，关节疼痛，屈伸不利，关节肿大僵硬，变形，肌肉萎缩，筋脉拘急，肘膝不伸，以尻代踵，以背代头，腰膝酸软，骨蒸潮热；舌红，脉细数。应选用的中成药有

- A. 痹痛宁胶囊
- B. 湿热痹颗粒
- C. 尪痹颗粒
- D. 风湿骨痛丸
- E. 益肾蠲痹丸

【答案】CE

【解析】

续表

辨证	症状	治法	方剂	中成药
着痹	肢体 关节酸痛、重着 ，患处肿胀，痛有定处，手足沉重，活动不利，肌肤麻木不仁。苔白腻，脉濡滑。	除湿通络祛风散寒	薏苡仁汤	寒湿者可选风湿痹康胶囊、痹痛宁胶囊；湿热者可选四妙丸、湿热痹痛颗粒
尪痹	痹证日久不愈，肢体、关节疼痛，屈伸不利， 关节肿大僵硬变形 ，甚则肌肉萎缩，筋脉拘急，肘膝不伸，或以尻代踵，以背代头，伴腰膝酸软，骨蒸潮热，自汗、盗汗，舌红或淡脉细数	化痰祛瘀滋养肝肾	桃红饮合独活寄生汤	独活寄生丸（合剂）、尪痹颗粒、益肾蠲痹丸

112. 针对虚寒证，可以采取的治法有

- A. 阳病治阴
- B. 阴病治阳
- C. 阳中求阴
- D. 阴中求阳
- E. 阴阳双补

【答案】BDE

【解析】

独家记忆

阴阳的考点主要集中在阴阳属性的划分、阴阳的临床应用等内容上。考点较分散，但每年必考。

1. 阴病治阳，阳病治阴

口诀：治啥啥虚，啥虚治啥。

阴病治阳：治阳，阳虚，阳偏衰，所以是用补阳药进行治疗。

阳病治阴：治阴，阴虚，阴偏衰，所以是用补阴药进行治疗。

2. 阴中求阳，阳中求阴（体现阴阳的互根互用）

口诀：求啥啥虚，啥虚求啥。

阴中求阳：用补阳药的同时佐以滋阴药。

阳中求阴：用补阴药的同时佐以补阳药。

113. 中医强调所证论治，不同疾病出现相同的证候可以采用相同的治疗方法。适合应用归脾丸治疗的疾病有

- A. 郁证
- B. 眩晕
- C. 不寐
- D. 泄泻
- E. 崩漏

【答案】ABCE

【解析】

续表

辨证	症状	治法	方剂	中成药
阴血亏虚	不寐，健忘，心悸怔忡，虚烦不安，甚则盗汗，梦遗等。舌偏淡，苔薄少，脉细或细数。	滋阴养血	天王补心丹	天王补心丹 养血安神丸
心脾两虚	不易入睡，多梦易醒，心悸健忘，神疲食少，四肢倦怠，腹胀便溏，面色少华，舌淡苔薄，脉细无力。	健脾养心	归脾汤	归脾丸、养心宁神丸

表3-16 眩晕的辨证论治

辩证	症状	治法	方剂	中成药
肝火上扰	眩晕耳鸣，头胀目痛，每因恼怒或疲劳而头晕、头痛加剧，急躁易怒，少寐多梦，时颜面潮红，口苦便秘。舌红，苔黄，脉弦。	清肝泻火	龙胆泻肝汤	龙胆泻肝丸、当归芦荟丸
气血亏虚	眩晕动则加剧，劳累即发，面色（白光）白，唇甲无华，心悸少寐，神疲懒言，饮食减少。舌淡，脉细弱。	益气养血	八珍汤	归脾丸、八珍颗粒、全大补丸

100% 100%

表3-21 不宁之气的郁证的辨证论治

辩证	症状	治法	方剂	中成药
肝气郁结	精神抑郁，情绪不宁，胸胁胀痛无定处，胸闷噎气，喜叹息，腹胀纳呆，大便或秘或泄，女子月事不行。苔薄腻，脉弦。	疏肝解郁	逍遥散	解郁安神丸、逍遥丸、加味逍遥丸、解郁丸
痰气郁结	咽中不洁，如有物梗阻，咽之不下，咯之不出，胸中闷塞，或兼胁痛。苔白腻，脉弦滑。	化痰利气	半夏厚朴汤	舒肝平胃丸、二陈丸合胃苏颗粒
心脾两虚	多思善虑，心悸胆怯，少寐健忘，面色不华，头晕神疲，食少纳呆，舌淡，脉细弱。	健脾养心	归脾汤	归脾丸、人参归脾丸

不宁之气的郁证的辨证论治

表3-33 崩漏的辨证论治

辩证	症状	治法	方剂	中成药
气血两虚	经血非时而下，量多如崩，或淋漓不断，色淡质稀，神疲体倦，气少懒言，面色无华，唇舌色淡，苔薄白，脉细弱。	补血益气，止血	圣愈汤合血安胶囊	定坤丹（主治气血两虚、气滞血瘀证）、同仁乌鸡白凤口服液、乌鸡白凤丸等
脾不统血	经血非时而下，量多如崩，或淋漓不断，色淡质稀，神疲体倦，气短懒言，不思饮食，四肢不温，或面浮肢肿，面黄，舌淡胖，苔薄白，脉缓弱。	健脾益气，固冲止血	固冲汤	人参归脾丸、归脾丸、安金丸（主治气血两虚、气滞血瘀证）

114. 具有协同增效作用的中西药联用药组有

- A. 甘草与呋喃唑酮联用治疗肾盂肾炎
- B. 黄连、黄柏与磺胺甲基异恶唑联用治疗痢疾
- C. 甘草与氢化可的松联用于抗炎
- D. 丹参注射液与间羟胺联用于升压
- E. 柴胡桂枝汤与苯妥英钠联用治疗癫痫

【答案】BCD

【解析】

第02讲 中西药的联合应用

正保医学教育网
www.med66.com

表9-5 中西药联用的特点总结

联用特点	中药或中成药品种	宜联用或同服的西药	联用作用
协同增效	黄连、黄柏	四环素、呋喃唑酮(痢特灵)、磺胺甲基异恶唑	治疗痢疾、细菌性腹泻
	金银花	青霉素	增强对耐药性金黄色葡萄球菌的抗菌作用
	丙谷胺	甘草、白芍、冰片	治疗消化性溃疡，与丙谷胺(胃丙胺)联用
	甘草	氢化可的松	在抗炎、抗变态反应中起协同作用

第02讲 中西药的联合应用

正保医学教育网
www.med66.com

续表

联用特点	中药或中成药品种	宜联用或同服的西药	联用作用
协同增效	丹参注射液、黄芪注射液、川芎嗪注射液等	低分子右旋糖酐、能量合剂	提高心肌梗死的抢救成功率
	丹参注射液	间羟胺(阿拉明)、多巴胺等	能加强升压作用，还能减少对升压药的依赖性
	生脉散、丹参注射液	莼蓉碱	治疗病态窦房结综合征，既可适度提高心率，又能改善血液循环，从而改善缺血缺氧的状况，达到标本兼治的目的

115. 小儿机体正处于生长发育阶段，不论在肌肤、脏腑、筋骨、津液等方面均柔弱不足，新陈代谢旺盛，吸收、排泄都较快，对药物敏感性强，关于小儿用药原则的说法，正确的有

- A. 小儿得病急，变化快，因此要及时用药
- B. 小儿外有表邪，内有火热之发热，宜用苦寒退热之品
- C. 小儿脏气清灵，若为风热表证，当以辛凉解散表邪
- D. 小儿脾气不足，治疗宜佐以健脾和胃、消食导滞之品
- E. 小儿出现壮热、烦躁、惊风等症，宜佐以平肝息风之品

【答案】ACDE

【解析】

第01讲 特殊人群的中药应用

正保医学教育网
www.med66.com

表10-11 婴幼儿患者合理应用中药的原则

婴幼儿患者合理应用中药的原则	具体的原因和可选用的药物
用药及时，用量宜轻	用药及时：小儿得病急，变化快，用药及时。 用量宜轻：小儿脏腑娇嫩，对药敏感，处方宜轻。
宜用轻清之品	小儿脏气清灵，对大苦、大辛、大寒、大热和药性峻烈的药物要慎用。 原因：小儿脾气不足，消化能力差，需用轻清之品。
宜佐健脾和胃之品	所用药物：需使用消食导滞的药物，如山楂、陈皮、六神曲、麦芽、鸡内金、

第01讲 特殊人群的中药应用

正保医学教育网
www.med66.com

续表

婴幼儿患者合理应用中药的原则	具体的原因和可选用的药物
宜佐凉肝定惊之品	原因：小儿体属“纯阳”，热病偏多，肝常有余，容易出现肝热抽搐、惊风之症。 所用药物：需使用平肝息风的药物，比如蝉蜕、钩藤、僵蚕、地龙等。
不宜滥用滋补之品	小儿生机旺盛，宜用饮食调理，不宜滥用滋补之品，否则会使机体阴阳失衡，伤及脏腑气机。

116.属于气机失常的病机变化有

- A.气滞
- B.气逆
- C.气陷
- D.气脱
- E.气虚

【答案】ABCD

【解析】

117.不得与含麻黄的中成药联用的成药有

- A.速效救心丸
- B.活心丹

- C. 山海丹胶囊
- D. 益心丸
- E. 滋心阴口服液

【答案】ABCDE

【解析】

第01讲 中药的合理应用

正保医学教育网
www.med66.com

表9-4 药物的相互作用问题

忌联用的两种药物	机制
含麻黄的中成药 忌与降血压的中成药如复方罗布麻片、降压片、珍菊降压片、牛黄降压丸等并用	麻黄中麻黄碱的作用与肾上腺素相似，能直接与肾上腺素受体结合，促使肾上腺素能神经释放介质，从而使血管收缩、血压升高
含朱砂较多的中成药如磁朱丸、更衣丸、安宫牛黄丸等	同服后，含汞、砷、铅等重金属离子或碘离子的中成药如消瘦五海丸、内消瘰疬丸等长期同服

118. 中药毒性反应引起生理生化功能异常和病理变化，可在各系统内发生，造成多系统的脏器的损害。关于中药发生毒性反应的机制和表现的说法正确的有

- A. 山药丸含马钱子，马钱子主要有毒成分为番木鳖碱，可首先兴奋神经系统，引起脊髓强直性痉挛，继而兴奋呼吸中枢及血管运动中枢可因呼吸痉挛窒息或心力衰竭而死亡
- B. 舒筋丸含乌头，乌头的主要成分为乌头碱，其毒性主要用于神经系统，尤其是迷走神经，并可直接作用于心脏，可致心律失常，甚至引起室颤和死亡
- C. 牛黄至宝丸含朱砂，朱砂的主要成分为汞，机体吸收和迅速弥散到各个器官和组织，并可通过血脑屏障进入脑组织，产生各种中毒症状
- D. 人参再造丸含雄黄，雄黄的主要成分为砷盐，砷盐毒性较大，进入人体后蓄积和分布于体内各组织，主要分布在肝肾脾等内脏及指甲，毛发等部位，产生一系列中毒症状
- E. 梅花点舌丸含蟾酥，蟾酥的三要素有毒成分为蟾酥的毒素，具有洋地黄样作用。小剂量能使心肌收缩力增强，大剂量则使心脏停止收缩期

【答案】AE

【解析】

二、马钱子及含马钱子的中成药

马钱子类中成药的中毒反应和基本救治原则见表11-6。

表11-6 马钱子类中成药的中毒反应和基本救治原则

名称	具体内容
含马钱子的中成药	九分散、山药丸、舒筋丸、疏风定痛丸、伤科七味片等
中毒机理	主要有毒成分：番木鳖碱即土的宁。成人中毒量：5~10mg；一次服用30mg即可致死。番木鳖碱首先兴奋中枢神经系统，引起骨髓强直性痉挛
中毒表现	初期出现头晕、头痛、烦躁不安、面部肌肉紧张、吞咽困难；进而伸肌与屈肌同时做极度收缩，发生典型的角弓反张的宁惊厥、痉挛，甚至角弓反张，可因呼吸肌痉挛或心力衰竭而死亡

三、蟾酥及含蟾酥的中成药

蟾酥类中成药的中毒反应和基本救治原则见表11-7。

表11-7 蟾酥类中成药的中毒反应和基本救治原则

名称	具体内容
含蟾酥的中成药	六神丸、六应丸、喉症丸、梅花点舌丸、麝香保心丸、麝香通心滴丸等
中毒机理	主要毒性成分：强心苷（蟾酥毒素），有洋地黄样作用。小剂量能使心肌收缩力增强，大剂量则使心脏停搏于收缩期
中毒表现	①循环系统：胸闷、心律失常、脉缓慢无力、心力衰竭、房室传导阻滞等，严重时面色苍白、口唇发绀、厥冷、大汗虚脱、血压下降、休克，甚至心搏骤停 ②消化系统：恶心呕吐、腹痛、腹泻等

119, 医生处方时会将几种疗效基础相似或协同作用的饮片缩写再一起并开, 炒四仙应付的饮片有

- A.炒山楂
- B.炒槟榔
- C.炒谷芽
- D.炒神曲
- E.炒麦芽

【答案】ABDE

【解析】

第01讲 中药调剂操作的基本技能知识 (一)

正保医学教育网
www.med66.com

腹皮子	大腹皮、生槟榔
焦三仙	焦神曲、焦山楂、焦麦芽
焦四仙	焦神曲、焦山楂、焦麦芽、焦槟榔
炒三仙	炒神曲、炒山楂、炒麦芽
炒知柏	盐知母、盐黄柏
生熟薏米	生薏米、熟薏米
全藿香	藿香叶、藿香梗
生熟谷芽	生谷芽、炒谷芽
谷麦芽	炒谷芽、炒麦芽
棱术	三棱、莪术
生熟枣仁	生枣仁、炒枣仁
盐知柏	盐知母、盐黄柏
生熟麦芽	生麦芽、熟麦芽
生熟地	生地、熟地

120. 药学咨询服务是执业药师参与全程化药物治疗的需要，对指导患者安全、有效、合理用药具有重大意义。执业药师应向患者提供咨询服务活动中需要特别关注的问题包括

- A. 患者疾病状况，比如肝肾功能指标，既往病史等
- B. 尊重患者意愿，保护患者隐私，不得将咨询信息用于商业目的
- C. 对老年人提供咨询服务时应适当的多使用文字，图片的形式
- D. 咨询要以容易理解的语言来解释，尽量使用带数字的术语
- E. 不能当场解答的问题，应进一步咨询相关资料后给予答复

【答案】ABCDE

【解析】

第01讲 中药文献信息与咨询服务

正保医学教育网
www.med66.com

续表

名称	具体内容
需特别提示的特殊情况	⑥患者正在使用的药物中有配伍禁忌或配伍不当时，应第一时间联系该医师以避免纠纷的发生；⑦用该药的患者⑧近期药品说明书有修改（如商品名、适应量、有效期、贮存条件、药品不良反应）⑨患者所用的药发现严重或罕见的不良反应⑩使用含有毒中药或有毒成分患者⑪同一种药品有多种适应证或用药剂范围较大或阈值时⑫药品被重新分装，而包装的标识物不清晰时⑬特殊贮存条件的药品时；或使用临近有效期药品时
需特别关注的问题	①对特殊人群需注意的问题②解释的技巧③尊重患者时回答不拖延