

【牙体牙髓病学】

冠部浅龋的龋坏程度仅限于

- A. 牙釉质内
- B. 釉牙本质内
- C. 釉质或根面牙骨质层内
- D. 牙本质内
- E. 牙骨质或牙本质内

【正确答案】 A

【答案解析】 浅龋的龋损在釉质或根面牙骨质层内。题目要求选择冠部（釉质覆盖部分）浅龋，所以冠部浅龋局限于牙釉质。

【牙体牙髓病学】

静止龋主要是在下列何种情况下产生的

- A. 患者抵抗力增加
- B. 牙齿硬组织不断矿化
- C. 牙面产生龋的条件消失
- D. 主要的致龋病菌减少
- E. 牙齿的抗酸力增强

【正确答案】 C

【答案解析】 静止龋：在龋进展过程中，由于局部环境发生变化，隐蔽部位变为开放状态，致龋因素消失，病变停止进展并再矿化，但已造成的牙体实质性缺损仍保持原状。

【儿童口腔医学】

以下哪项不是年轻恒牙龋病的特点

- A. 发病早
- B. 耐酸性差易患龋
- C. 龋坏进展快，易形成牙髓炎和根尖周炎
- D. 受乳牙患龋状态的影响
- E. 第一恒磨牙常出现肉眼可见的大面积龋坏

【正确答案】 E

【答案解析】 年轻恒牙龋病的特点：

①发病早。第一恒磨牙（六龄牙）萌出早，龋齿发生早，患龋率高。在混合牙列期，第一恒磨牙易被误认为乳磨牙而延误治疗；

②耐酸性差易患龋。年轻恒牙牙体硬组织矿化程度比成熟恒牙釉质差，在牙齿新萌出的2年内易患龋；

③龋坏进展快, 易形成牙髓炎和根尖周炎, 年轻恒牙的髓腔大, 髓角高, 牙本质小管粗大, 髓腔又近牙齿表面, 所以龋齿进展速度快, 加上年轻恒牙矿化程度差, 龋患往往很快波及牙髓。

④受患龋状态的影响。临床上常见因第二乳磨牙远中面龋未经过及时治疗, 导致远中的第一恒磨牙的近中面脱矿和龋洞形成。乳牙龋多发对于刚萌出的年轻恒牙存在较大的患龋隐患。

⑤第一恒磨牙常出现潜行性龋(隐匿性龋)。因为釉板结构的存在, 致龋细菌可直接在牙体内部形成龋洞, 而牙齿表面完好无损。

【儿童口腔医学】

以下不是乳牙龋齿特点的是

- A. 自觉症状不明显容易忽视
- B. 龋蚀多发广泛
- C. 静止龋中以环状龋为主
- D. 发病时间早, 5~8 岁达高峰
- E. 龋齿进展快

【正确答案】 C

【答案解析】 乳牙在临床上可表现为急性龋与慢性龋, 湿性龋与干性龋。乳牙以急性龋和湿性龋多见。环状龋属于活动龋的范畴。