

医学教育网主管护师：《答疑周刊》2020 年第 33 期

1. 【问题】老师妊娠 49 天，终止妊娠最常用且较安全的方法是口服药物终止，还是钳刮术！

【解答】药流或负压吸引。

药物流产适用于妊娠 7 周内者。

人工流产负压吸引术：适用孕 6~10 周以内。

人工流产钳刮术：适用孕 11~14 周者。

中期妊娠引产术常用于 15~24 周妊娠者。

指妊娠 13 周至不足 28 周之间用人工方法终止妊娠为中期妊娠终止。在妊娠 13~14 周期间常用钳刮术，中期妊娠引产术常用于 15~24 周妊娠者，需住院引产。依沙吖啶（利凡诺）引产。

2. 【问题】开放性颅脑损伤为什么是颅底骨折？

【解答】如合并有脑脊液漏的颅底骨折属开放性颅脑损伤，系内开放性颅脑损伤。您也可以理解为与外界相通的为开放性骨折。

3. 【问题】什么叫做开放性损伤？什么叫做闭合性损伤？什么叫做贯通伤？

【解答】开放性损伤指受伤部位的内部组织(如肌肉、骨头等)与外界相通的损伤，繁殖就是闭合的了；

外贯通伤是致伤物贯通机体，有入口及出口的开放性损伤，伤道可在出、入口直线上，亦可因体位改变或使致伤物遇到阻力改变方向而引起不同部位损伤；或子弹由一侧穿入颅内，又由对侧穿出头颅。通常入口小于出口，因此创道呈喇叭形，此时颅内虽无子弹停留，但创道可停留其他异物和发生血肿。要及时清创、探查损伤情况，进行相应处理。

4. 【问题】急性脓胸并发支气管胸膜瘘最主要的治疗方法是什么？

【解答】急性脓胸发病快，积液多且粘稠，病情危重，有中毒症状的，胸腔穿刺后积液又迅速生成时需行胸腔闭式引流；合并有支气管胸膜瘘或食管胸膜瘘的脓气胸，也需行胸腔闭式引流。

5. 【问题】重症肌无力首选什么药？

【解答】①抗胆碱酯酶药物：通过抑制胆碱酯酶的活性，使释放至突触间隙的 Ach 存活时间延长而发挥效应。常用药物有溴化新斯的明片剂、吡斯的明片剂、美斯的明片剂，同时可辅用氯化钾、麻黄碱，有加强抗胆碱酯酶药物疗效的作用。

②糖皮质激素：通过抑制 AchR 抗体的生成发挥作用。

③免疫抑制剂：首选硫唑嘌呤。

