

自主招聘

临床专业模拟试 答案解析

一、单选题（A 型题）

1. 【正确答案】B

【答案解析】生后 4~10 个月乳牙开始萌出，儿童在 6 岁左右萌出第一颗恒牙，6~12 岁阶段乳牙逐个被同位恒牙替换，12 岁萌出第二恒磨牙。

2. 【正确答案】D

【答案解析】川崎病心电图早期示非特异性 ST-T 变化；心包炎时可有广泛 ST 段抬高和低电压；心肌梗死时 ST 段明显抬高、T 波倒置及异常 Q 波。无 P 波异常。

3. 【正确答案】A

【答案解析】未接种卡介苗的婴幼儿，结核菌素试验（PPD 试验）阳性说明体内有新的结核病灶，应预防性抗结核治疗（A）。

预防性抗结核治疗的适应证为：

- ①密切接触家庭内开放性肺结核者；
- ②3 岁以下婴幼儿未接种卡介苗而 PPD 试验阳性者；
- ③PPD 试验新近由阴性转为阳性者；
- ④PPD 试验阳性伴结核中毒症状者；
- ⑤PPD 试验阳性，新患麻疹或百日咳小儿；
- ⑥PPD 试验阳性小儿需长期使用糖皮质激素或其他免疫抑制剂者。

4. 【正确答案】A

【答案解析】肠套叠灌肠禁忌症：

- ①病程已超过 48 小时；
- ②高度腹胀；
- ③套叠头部已达脾曲；

④多次复发疑有器质性病变者；

⑤小肠型肠套叠。

5. 【正确答案】D

【答案解析】室间隔缺损的种类包括膜周型、肌部型、双动脉下型。故 D 错。

6. 【正确答案】B

【答案解析】抑制宫缩药目前常用的药物有利托君、沙丁胺醇、硫酸镁、前列腺素合成酶抑制剂等；钙拮抗剂可抑制缩宫素和前列腺素的释放。所以本题选 B。

7. 【正确答案】D

【答案解析】外阴鳞状上皮细胞增生时，用 1% 甲苯胺蓝涂抹病变处皮肤，晾干后用 1% 醋酸液擦洗脱色，凡不脱色处，说明有裸核存在，应该在该处去取材。

8. 【正确答案】D

【答案解析】因为患者有足月顺产巨大儿史，在顺产过程中可导致宫颈内口松弛。

9. 【正确答案】C

【答案解析】雌激素由胎儿胎盘共同产生，故称为胎儿胎盘单位。雌三醇前身物质可由母体和胎儿肾上腺及肝产生，雌三醇前身物质是胎盘合成雌三醇的主要来源。

10. 【正确答案】B

【答案解析】根据胎盘边缘与宫颈内口的关系分为 3 类：

①完全性（中央性）前置胎盘：宫颈内口全部被胎盘组织覆盖。

②部分性前置胎盘：宫颈内口部分被胎盘组织覆盖。

③边缘性前置胎盘：胎盘边缘附着在子宫下段，不超越宫颈内口。④低置胎盘：胎盘附着于子宫下段，边缘距宫颈内口 $<2\text{cm}$ 。

11. 【正确答案】B

【答案解析】伤寒和副伤寒最典型的临床表现为玫瑰疹。

12. 【正确答案】A

【答案解析】右心衰竭时，常有颈静脉怒张，触诊可触及不同程度的肝大、压痛及肝颈反流征阳性。

13. 【正确答案】C

【答案解析】呕吐隔餐或隔日食物，并含腐酵气味，见于幽门梗阻。呕吐物中有蛔虫者见于胆道蛔虫、肠道蛔虫。

14. 【正确答案】B

【答案解析】糖化血红蛋白是葡萄糖或其他糖与血红蛋白的氨基发生非酶催化反应的产物。它通过缓慢、持续和不可逆的糖化反应形成，其含量的多少取决于血糖浓度及血糖与血红蛋白接触时间，而与抽血时间患者是否空腹、是否使用胰岛素等因素无关。因此，它可以有效地反映糖尿病患者过去 2~3 个月内血糖的控制情况，被用作糖尿病控制的监测指标。

15. 【正确答案】B

【答案解析】患者不规律应用胰岛素治疗，血糖 22mmol/L ，尿糖（++++），酮体（+++），呼吸深大有异味，高度怀疑为糖尿病酮症酸中毒（DKA）。DKA 主要表现为高血糖、酮症、代谢性酸中毒。

16. 【正确答案】C

【答案解析】胸骨左缘第 2 肋间及左锁骨下方可闻及连续性机械样杂音可见于动脉导管未闭。房间隔缺损可闻及肺动脉瓣区 II-III 级收缩期喷射性杂音。

二尖瓣关闭不全可闻及心尖区收缩期吹风样杂音。心前区叹气样舒张期杂音见于主动脉夹层。

17. 【正确答案】C

【答案解析】反映下壁心肌梗死的心电图导联为 II、III、aVF 导联。

18. 【正确答案】D

【答案解析】室性心动过速诊断重要依据是心室夺获或室性融合波。

19. 【正确答案】B

【答案解析】患者反复上腹痛，多为空腹痛及夜间痛，应考虑十二指肠溃疡。患者呕吐宿食 2 周，应诊断为十二指肠溃疡并幽门梗阻。患者反复呕吐，大量胃酸丢失，常导致低钾低氯性代谢性碱中毒。所以选 B。

20. 【正确答案】B

【答案解析】甲状腺结节的辅助检查首选 B 超，可了解结节大小、位置、囊实性。注意：题干要求回答的是“辅助检查”而不是“确诊检查”，若为确诊检查则答 C。所以本题选 B。

21. 【正确答案】A

【答案解析】乳管内乳头状瘤多发生于大乳管近乳头的壶腹部，瘤体很小，带蒂，有绒毛，有很多薄壁血管，故易出血，多为乳头鲜红色血性溢液。乳腺囊性增生症、乳腺癌鲜红色乳头血性溢液少见。乳腺纤维腺瘤无乳头溢液。所以选 A。

22. 【正确答案】B

【答案解析】硬膜外血肿可有典型的中间清醒期，即表现为受伤→昏迷→清醒→再次昏迷。伤后出现的第一次昏迷是由于脑震荡或脑挫裂伤所造成，由于此类病人原发性脑损伤多较轻，昏迷时间较短，一般在 30 分钟以内；随着血肿量增加，血肿造成的颅内高压形成脑疝而引起再次昏迷。若血肿形成

速度较慢，则中间清醒期较长；若血肿形成的较快，则中间清醒期极短。因此中间清醒期的长短主要取决于血肿形成的速度。

23. 【正确答案】C

【答案解析】反常呼吸运动为多根多处肋骨骨折的特征性表现。根据题干，本例应诊断为多根多处肋骨骨折。气胸常表现为呼吸困难，纵隔向健侧移位，叩诊肺部呈鼓音。血胸常表现为呼吸困难，纵隔向健侧移位，叩诊肺部呈浊音。支气管断裂若裂口与胸膜相通，可表现为明显气胸。所以本题选 C。

24. 【正确答案】B

【答案解析】HBV 属于 DNA 病毒，其他三种属于 RNA 病毒。

25. 【正确答案】D

【答案解析】典型伤寒的病程大概持续 4 到 5 周。

26. 【正确答案】B

【答案解析】流行性出血热病变最明显的脏器是肾。

二、多选题（X 型题）

1. 【正确答案】ABCD

【答案解析】PCOS 的诊断为排除性诊断：目前较多采用的是鹿特丹标准：

①稀发排卵或无排卵；

②高雄激素的临床表现和（或）高雄激素血症；

③卵巢多囊改变：超声提示一侧或双侧卵巢直径 2~9mm 的卵泡 \geq 12 个，和（或）卵巢体积 \geq 10ml；

④3 项中符合 2 项并排除其他高雄激素病因，如先天性肾上腺皮质增生、库欣综合征、分泌雄激素的肿瘤。

2. 【正确答案】ABD

【答案解析】体征

1. 乳房的变化乳房渐大，自觉乳房轻度胀痛及乳头疼痛。检查见乳头及乳晕着色加深，乳晕周围有蒙氏结节出现。

2. 生殖器官的变化妊娠 6~8 周可见阴道壁及宫颈充血，呈紫蓝色。双合诊检查发现宫颈变软，子宫峡部极软，感觉宫颈与宫体似不相连，称为黑格征(Hegarsign)。

辅助检查

1. B 型超声显像法在增大的子宫轮廓中，见到来自羊膜囊的圆形光环，妊娠环内为液性暗区(羊水)。最早在妊娠 5 周时见到妊娠环。若在妊娠环内见到有节律的胎心搏动和胎动，可确诊为早期妊娠活胎。

2. 妊娠试验用酶联免疫吸附法检测，若为阳性表明受检者尿中含有 hCG，可以协助诊断早期妊娠。

3. 宫颈黏液检查宫颈黏液涂片干燥后光镜下见到排列成行的椭圆体，则早期妊娠的可能性大。

4. 黄体酮试验利用孕激素在体内突然撤退能引起子宫出血的原理，每日肌注黄体酮 20mg，连用 3 天，停药后观察 2~7 天，若超过 7 天仍未出现阴道流血，则早期妊娠的可能性很大。

3. 【正确答案】ACD

【答案解析】黄体功能不全(LPD)的发病机制目前还不完全明确，可能与下列因素有关：由于排卵前 LH 分泌的高峰及其月经不同时期，脉冲节律性释放，调控着卵泡排卵和颗粒细胞黄素化。故任何因此干扰了 LH 的分泌量或影响了 LH 脉冲节律，都将影响黄体对孕酮的合成和分泌，导致 LPD。另外，FSH、E、PRL 及前列腺素(PG)都能影响 LH，或间接影响卵泡发育，颗粒细胞黄素化，干扰黄体功能，导致不孕。同时基础体温之测量，亦可证明这一点，黄体功能不全者，基础体温双相曲线均不典型，月经后期呈阶梯形上升，升亦不稳。因黄体产生之黄体酮，是一种致热源，可使体温升高，排卵后期基础体温上升，即源于此。

4. 【正确答案】ABC

【答案解析】胎膜早破常是多因素所致。常见因素有：生殖道病原微生物上

行性感染；双胎妊娠或羊水过多导致的羊膜腔压力增高；头盆不称和胎位异常导致的胎膜受力不均；缺乏维生素 C、锌及铜；宫颈内口松弛等。

5. 【正确答案】 ABC

【答案解析】 该病为混合菌感染，以厌氧菌为主。

6. 【正确答案】 BCD

【答案解析】 检查前医师应该保持双手干净，防止造成交叉感染，其他三项均为体格检查时的注意事项。

7. 【正确答案】 CD

【答案解析】 甲状腺乳头状癌多见于 30-45 岁的女性，恶性程度较低，约 80% 肿瘤为多中心性，约 1/3 累及双侧甲状腺。较早便出现颈淋巴结转移。所以本题选 CD。

8. 【正确答案】 ABD

【答案解析】 乳腺的腺叶和乳管均以乳头为中心呈放射状排列，为避免损伤乳管形成乳瘘，乳房表浅脓肿切开引流，应以乳头为中心作放射状切口。乳晕下脓肿应沿乳晕边缘作弧形切口。深部脓肿应沿乳房下缘作弧形切口，经乳房后间隙引流。脓肿较大时，可作低位对口引流。作脓肿切开引流时应避免损伤乳管，而不是切开乳管充分引流，否则损伤乳管将导致乳瘘。所以选 ABD。

9. 【正确答案】 ABD

【答案解析】 特异性感染是指某种病菌只引起某种特定的感染性疾病，某种感染性疾病只由这种特定的病菌引起，致病菌与感染性疾病之间具有一一对应关系，如破伤风梭菌只能引起破伤风，结核杆菌只能引起结核病，真菌只能引起真菌感染，这些感染性疾病均属于特异性感染。 β 溶血性链球菌既可引起急性蜂窝织炎，也可引起上呼吸道感染等，致病菌与疾病之间不是一一对应关系，因此不属于特异性感染，而是非特异性感染。所以本题选 ABD。

10. 【正确答案】BC

【答案解析】骨筋膜室是指由骨、骨间膜、肌间隔和深筋膜组成的间隙。前臂有尺骨和桡骨组成的骨筋膜室，小腿有胫骨和腓骨组成的骨筋膜室，因此前臂和小腿是骨筋膜室综合征的好发部位。选 BC。

11. 【正确答案】ABCD

【答案解析】耻骨联合骨折可刺破膀胱，导致血尿。会阴部瘀斑为耻骨骨折的特有体征，骨盆挤压试验和分离试验阳性为骨盆骨折的特征性体征。所以答案选 ABCD。

12. 【正确答案】ABCD

【答案解析】ABCD 与肝癌的发生均有密切的关系。

13. 【正确答案】ABCD

【答案解析】A、B、C、D 都是巨幼红细胞性贫血的发生机制。

14. 【正确答案】ABCD

【答案解析】急性肾损伤是由各种病因引起短时间内肾功能快速减退而导致的临床综合征，表现为肾小球滤过率下降，伴有氮质产物如肌酐、尿素氮等潴留，水、电解质和酸碱平衡紊乱，可有贫血，重者出现多系统并发症。

15. 【正确答案】ABD

【答案解析】先天储铁不足是营养性缺铁性贫血发病的原因之一。

16. 【正确答案】ABC

【答案解析】重症肌无力眼肌型的临床表现是肌肉无力，眼睑下垂，瞳孔正常，直接对光反射正常。

17. 【正确答案】ACD

【答案解析】贫血常见的面容为面色苍白、表情疲乏和唇舌色淡，鼻翼扇动是急性面容。

18. 【正确答案】ABC

【答案解析】按压深度至少为胸部前后径的三分之一，婴儿大约为 4cm，儿童大约为 5cm，青春期儿童不超过 6cm。）（D 错）。其余均正确。

19. 【正确答案】ACD

【答案解析】关于溺水预后，一般生命体征要是恢复不好，预后就是越不好。时间长，复苏后血流慢，说明预后越不好。

20. 【正确答案】ACD

【答案解析】

①患儿自幼有哮喘发作史，支气管舒张试验阳性，应确诊为支气管哮喘。此次发作为呼吸困难，大汗淋漓，三凹征，无哮鸣音，心音较低钝，应诊断为哮喘危重状态。对于危重哮喘，应注意补液纠酸，维持水电解质平衡，故 A 对。所有危重哮喘患儿均存在低氧血症，均需常规氧疗，故 D 对。当 $\text{PaCO}_2 > 65\text{mmHg}$ 、出现意识障碍时，应辅以机械通气，故 C 对。

②全身应用糖皮质激素是儿童危重哮喘的一线治疗，应尽早使用。病情严重时，不能以吸入治疗代替全身糖皮质激素治疗，以免延误病情，故不答 B

21. 【正确答案】ABCD

【答案解析】婴幼儿体内 VitD 的来源有三个途径：即母体-胎儿的转运、食物中的 VitD、皮肤的光照合成。天然食物和母乳含 VitD 均很少，谷类、蔬菜、水果中不含 VitD，肉和白鱼含量很少，因此婴幼儿若长期奶糕喂养、偏食、单纯母乳或牛奶喂养，若不进行户外活动，均可导致 VitD 摄入不足，而发生 VitD 缺乏性佝偻病。患儿消化吸收障碍，影响 VitD 的肠道吸收，当然会导致 VitD 缺乏。

22. 【正确答案】 ABD

【答案解析】 预防接种的时间记忆为：出生乙肝卡介苗，二月脊灰炎正好，三四五月百白破，八月麻疹岁乙脑，根据此口诀可知，麻疹疫苗的接种时间为出生后 8 个月。

23. 【正确答案】 ABC

【答案解析】 艾滋病的传播途径的有性接触传播、血型传染、母婴垂直传播。

24. 【正确答案】 ABD

【答案解析】 肾综合症出血热的临床表现，主要分为五期，包括发热期、低血压休克期、少尿期、多尿期、恢复期。

25. 【正确答案】 ABD

【答案解析】 易感者不属于传染源。

三、判断题

1. 【正确答案】 对

【答案解析】 乳房萌发是女性第二性征的最初特征，月经初潮为青春期的重要标志。

2. 【正确答案】 错

【答案解析】 子宫峡部非孕时长约 1cm，妊娠后子宫峡部变软，逐渐伸展拉长变薄，扩展成宫腔一部分，临产后伸展至 7~10cm，成为产道一部分，称为子宫下段。

3. 【正确答案】 对

【答案解析】 早期流产与胚胎染色体异常有关，晚期流产多见于宫口松弛。

4. 【正确答案】 错

【答案解析】 妊娠期高血压、子痫前期患者可期待治疗至 37 周终止妊娠。

5. 【正确答案】错
【答案解析】过期妊娠胎儿生长模式与胎盘功能有关，可分 3 种：正常生长及巨大胎儿、胎儿过熟综合征、胎儿生长受限。
6. 【正确答案】对
【答案解析】小儿上呼吸道感染最常见的病原体是呼吸道合胞病毒。
7. 【正确答案】对
【答案解析】适宜卡介苗（BCG）接种的主要对象是新生儿以及结核菌素试验阴性的儿童。
8. 【正确答案】对
【答案解析】蛋白质-能量营养不良患儿皮下脂肪逐渐减少的顺序是腹部→躯干→臀部→四肢→面颊。
9. 【正确答案】对
【答案解析】膝腱反射生后即活跃，可终生存在。
10. 【正确答案】错
【答案解析】心肺复苏的正确顺序为 C-A-B。
11. 【正确答案】错
【答案解析】急性阑尾炎若未及时治疗，脓液可积聚在阑尾周围，大网膜可移至右下腹，将阑尾包裹粘连，形成炎性包块或阑尾周围脓肿。
12. 【正确答案】对
【答案解析】急性胰腺炎常表现为左上腹疼痛，可向左肩及左腰背部放射。

13. 【正确答案】对

【答案解析】膀胱结石的典型症状是排尿突然中断，改变体位后可继续排尿，常伴排尿困难和膀胱刺激症状。

14. 【正确答案】错

【答案解析】损伤性骨化也称骨化性肌炎，多见于关节扭伤、脱位、关节附近的骨折。特别多见于肘关节，如肱骨髁上骨折，若反复暴力复位，可导致损伤性骨化。

15. 【正确答案】对

【答案解析】骨与关节结核发病率最高的部位是脊柱（约占 50%），其次为膝关节、髋关节等。

16. 【正确答案】对

【答案解析】过清音介于鼓音与清音之间，是属于鼓音范畴的一种变音，音调较清音低，音响较清音强，为一种类乐性音，是正常成人不会出现的一种病态叩击音。

17. 【正确答案】对

【答案解析】杵状指见于慢性肺脓肿、支气管扩张、支气管肺癌、发绀型先天性心脏病、亚急性感染性心内膜炎、肝硬化等。

18. 【正确答案】对

【答案解析】左心衰竭，其心尖区闻及舒张早期第三心音、第四心音奔马律。

19. 【正确答案】对

【答案解析】急性呼吸窘迫综合征是一种非心源性肺水肿。

20. 【正确答案】错

【答案解析】阻塞性黄疸病人尿胆原（-），尿胆红素（+）。

21. 【正确答案】错

【答案解析】慢性粒细胞白血病周围血中性粒细胞碱性磷酸酶活性是减低或零分。

22. 【正确答案】错

【答案解析】还需要满足糖尿病的诊断，正常人饥饿时尿中也可以见到酮体。

23. 【正确答案】错

【答案解析】当患者进入恢复期后，已经稳定退热一段时间，由于体内残存病原体再度繁殖而使临床表现再度出现的情形称为复发。

24. 【正确答案】对

【答案解析】前驱期是从起病至临床，症状明显开始的时期，通常是非特异性的。