

中西医部分模考试卷讲解
主讲：江行桐 时长：180 分钟

一、A1

1. 下列属于痰痛的特点表现的是
 - A. 攻痛无常，时感抽掣，喜缓怒甚
 - B. 痛而酸胀，肢体沉重，按之出现可凹性水肿
 - C. 疼痛轻微，或隐隐作痛，皮色不变，压之酸痛
 - D. 痛势急胀，痛无止时，如同鸡啄，按之中软应指
 - E. 初起隐痛、胀痛，皮色不变或皮色暗褐，或见皮色青紫瘀斑

2. 下列何种情况可出现“三陷一低”的表现
 - A. 等渗性缺水中度
 - B. 高渗性缺水中度
 - C. 等渗性缺水重度
 - D. 高渗性缺水重度
 - E. 休克

3. 下列不属急性蜂窝组织炎中医证型的是
 - A. 腓发
 - B. 锁喉痛
 - C. 蝼蛄疔
 - D. 手背发
 - E. 足背发

4. 急性淋巴结炎的中医证型不包括
 - A. 红丝疔
 - B. 颈痈
 - C. 腋痈
 - D. 锁喉痈
 - E. 胯腹痛

5. 治疗甲状腺功能亢进症之肝郁痰结证，方剂宜选用
 - A. 龙胆泻肝汤
 - B. 海藻玉壶汤合神效瓜蒌散
 - C. 丹栀逍遥散合天王补心丹
 - D. 柴胡疏肝散合海藻玉壶汤
 - E. 六味地黄汤合黄连阿胶汤

6. 腹腔镜手术的适应证不包括
 - A. 胃肠道手术
 - B. 肝胆系手术
 - C. 泌尿系手术
 - D. 淋巴结清扫术
 - E. 脾切除

7. 疮疡成脓期, 正虚毒盛, 无力托毒外达, 中医治法是

- A. 清热解毒
- B. 补虚扶正
- C. 透托法
- D. 补托法
- E. 软坚散结

8. 下列不属急性胰腺炎主要症状的是

- A. 起始于中上腹的腹痛
- B. 呈腰带状放射痛
- C. 恶心、呕吐
- D. 腹胀
- E. 休克

9. 公认的外科治疗胃、十二指肠溃疡的方法为

- A. 放射治疗
- B. 胃小部分切除术
- C. 迷走神经切断术
- D. 化学药物治疗
- E. 内分泌疗法

10. 多发于骨骼或关节间等深部组织的化脓性疾病是

- A. 疮疡
- B. 肿疡
- C. 溃疡
- D. 有头疽
- E. 无头疽

11. 脑震荡苏醒期的治疗, 常选用的方剂是

- A. 至宝丹
- B. 归脾丸
- C. 苏合香丸
- D. 安宫牛黄丸
- E. 柴胡细辛汤

12. 疼痛轻微, 或隐隐作痛, 皮色不变, 压之酸痛, 属于

- A. 寒痛
- B. 风痛
- C. 湿痛
- D. 痰痛
- E. 化脓痛

13. 全身麻醉并发血压下降时首先应采取的处理措施是

- A. 吸氧, 保持呼吸道通畅

- B. 静注麻黄素
- C. 静注琥珀酰胆碱
- D. 气管内插管
- E. 心肺复苏

14. 下列不属于良性肿瘤的是

- A. 纤维瘤
- B. 脂肪瘤
- C. 血管瘤
- D. 腺瘤
- E. 癌肉瘤

15. 下列可出现骨节酸痛的表现的是

- A. 甲亢
- B. 胆囊炎
- C. 消化性溃疡
- D. 肝硬化
- E. 急性乳腺炎

16. 发病急骤，肿势表现为漫肿宣浮，不红微热，轻微疼痛的是

- A. 热肿
- B. 寒肿
- C. 风肿
- D. 湿肿
- E. 痰肿

17. 下列哪项属于湿胜导致的痒

- A. 走窜无定，遍体作痒，抓破血溢
- B. 浸淫四窜，黄水淋漓，最易沿表皮蚀烂，越腐越痒
- C. 皮肤隐疹，焮红灼热作痒，或只发于裸露部位
- D. 浸淫蔓延，黄水频流，状如虫行皮中，其痒尤甚
- E. 皮肤变厚、干燥、脱屑，很少糜烂流滋水

18. 气郁血瘀型胰腺损伤的治疗首选方剂是

- A. 清营汤
- B. 膈下逐瘀汤
- C. 血府逐瘀汤
- D. 黄连解毒汤
- E. 越鞠丸合复元活血汤

19. 阑尾炎最重要的特征是

- A. 反跳痛
- B. 腹肌紧张
- C. 右下腹包块

- D. 右下腹痛反跳痛
- E. 右下腹局限性显著压痛

20. 肠梗阻的病因中，2 岁以下小儿最多见的是

- A. 肠道先天畸形
- B. 肠套叠
- C. 蛔虫团堵塞
- D. 肿瘤堵塞
- E. 粪块堵塞

21. 治疗子痫的痰火上扰证选用的方剂是

- A. 天仙藤散
- B. 羚角钩藤汤
- C. 牛黄清心丸
- D. 杞菊地黄丸
- E. 半夏白术天麻汤

22. 下列关于精子和卵子受精部位叙述正确的是

- A. 输卵管间质部
- B. 子宫腔
- C. 输卵管峡部
- D. 输卵管伞部
- E. 输卵管壶腹部与峡部连接处

23. 以下哪项不是妇科外治法

- A. 贴敷法
- B. 割治法
- C. 外阴熏洗
- D. 肛门导入
- E. 阴道纳药

24. 下列哪项是心脏病孕妇最危险的妊娠时期

- A. 妊娠 24~28 周
- B. 妊娠 26~30 周
- C. 妊娠 28~30 周
- D. 妊娠 32~34 周
- E. 妊娠 34~36 周

25. 产褥感染的西医治疗不包括

- A. 高热时给予物理降温
- B. 缩宫剂必须与抗生素同用
- C. 根据药敏试验选用抗生素
- D. 平卧休息，供给足够营养
- E. 会阴伤口感染化脓时要及早拆线

26. 产褥感染发热一般出现在产后

- A. 2~3 天
- B. 3~5 天
- C. 3~7 天
- D. 4~7 天
- E. 5~7 天

27. 血虚化燥型的外阴硬化性苔癣在治疗上首选的方剂是

- A. 肾气丸
- B. 人参养荣汤
- C. 知柏地黄汤
- D. 黄芪当归散
- E. 归肾丸合二至丸

28. 下列哪项是崩漏的主要病机

- A. 任督损伤，不能制约经血
- B. 冲任损伤，不能制约经血
- C. 肾虚不固，不能封藏经血
- D. 任带损伤，不能制约经血
- E. 瘀阻冲任胞宫，血不归经

29. 治疗肾气亏虚型子宫脱垂的首选方剂是

- A. 四物汤
- B. 大补元煎
- C. 大补阴丸
- D. 补中益气汤
- E. 人参养荣汤

30. 治疗肾气虚弱型不孕症，治法宜选用

- A. 补肾益气，温养冲任
- B. 滋阴养血，调冲益精
- C. 温肾养血，调冲益精
- D. 补肾益气，调冲益精
- E. 温肾养血益气，调补冲任

31. 治疗痰火上扰型子痫的首选方剂是

- A. 天仙藤散
- B. 羚角钩藤汤
- C. 杞菊地黄丸
- D. 牛黄清心丸
- E. 半夏白术天麻汤

32. 儿童期宫体与宫颈的比例是

- A. 1: 1

- B. 2: 1
- C. 1: 2
- D. 3: 1
- E. 3: 2

33. 以下哪项是临产后最主要的产力

- A. 腹肌收缩力
- B. 膈肌收缩力
- C. 子宫收缩力
- D. 肛提肌收缩力
- E. 骨骼肌收缩力

34. 下列关于多囊卵巢综合征中腹腔镜下卵巢打孔术的叙述正确的是

- A. 适用于 LH 和游离睾酮降低、对促排卵药物治疗无效者
- B. 适用于 LH 升高、游离睾酮降低、对促排卵药物治疗无效者
- C. 适用于 LH 和游离睾酮升高、对促排卵药物治疗无效者
- D. 适用于 LH 降低、游离睾酮升高、对促排卵药物治疗无效者
- E. 以上都不是

35. 下列关于出口横径的叙述正确的是

- A. 又称坐骨结节间径，平均值为 7cm
- B. 又称坐骨结节间径，平均值为 9cm
- C. 又称坐骨结节间径，平均值为 10cm
- D. 又称坐骨结节间径，平均值为 11cm
- E. 又称坐骨结节间径，平均值为 12cm

36. 下列关于胎盘组成的叙述，正确的是

- A. 叶状绒毛膜+底蜕膜+羊膜
- B. 平滑绒毛膜+包蜕膜+羊膜
- C. 叶状绒毛膜+真蜕膜+底蜕膜
- D. 平滑绒毛膜+底蜕膜+真蜕膜
- E. 叶状绒毛膜+包蜕膜+真蜕膜

37. 产后尿潴留的主要病机为

- A. 膀胱失约
- B. 膀胱气化不利
- C. 肾阳不振，气化失司
- D. 脾肺气虚，不能通调水道
- E. 气机阻滞，清浊升降失常

38. 治疗肾虚肝郁型绝经综合征应选用的方剂为

- A. 二至丸
- B. 一贯煎
- C. 一阴煎

- D. 知柏地黄丸
- E. 六味地黄丸

39. 关于枕先露分娩机制的顺序正确的是

- A. 衔接-下降-内旋转-俯屈-仰伸-复位及外旋转-胎肩及胎儿娩出
- B. 衔接-下降-俯屈-内旋转-仰伸-复位及外旋转-胎肩及胎儿娩出
- C. 衔接-下降-俯屈-外旋转-仰伸-复位及内旋转-胎肩及胎儿娩出
- D. 衔接-下降-仰伸-内旋转-俯屈-复位及外旋转-胎肩及胎儿娩出
- E. 衔接-下降-仰伸-外旋转-俯屈-复位及内旋转-胎肩及胎儿娩出

40. 气虚型产后尿潴留的首选方剂是

- A. 生化汤
- B. 黄芪当归散
- C. 补气通脬饮
- D. 加味四物汤
- E. 黄芪桂枝五物汤

41. 导致孕产妇死亡的常见原因是

- A. 子痫
- B. 产科出血
- C. 产褥感染
- D. 妊娠合并心脏病
- E. 以上均是

42. 治疗血热型晚期产后出血的代表方为

- A. 保阴煎
- B. 胶艾汤
- C. 生化汤
- D. 归脾汤
- E. 补中益气汤

43. 下列哪项不是病毒性脑炎痰蒙清窍证的症候表现

- A. 起病稍缓、表情淡漠
- B. 目光呆滞、喃喃自语
- C. 口角流涎、喉间痰鸣
- D. 颈项强直、烦躁不安
- E. 舌苔白、脉弦滑

44. 中度脱水时患儿失水量约为体重的

- A. 5%~10%
- B. 10%以上
- C. 5%左右
- D. 5%以下
- E. 以上均非

45. 下列关于过敏性紫癜皮肤紫癜的叙述错误的是

- A. 皮肤紫癜多见于四肢及臀部
- B. 皮疹初为小型荨麻疹、高出皮肤，压之退色
- C. 皮疹无压痛、呈对称性分布
- D. 面部少见
- E. 部分累及上肢、躯干

46. 引起鹅口疮致病的病原菌为

- A. 霍乱弧菌
- B. 痢疾杆菌
- C. 大肠杆菌
- D. 白色念珠菌
- E. 梭状芽胞杆菌

47. 治疗特发性血小板减少性紫癜气滞血瘀证的首选方剂是

- A. 茜根散
- B. 桃仁汤
- C. 大补阴丸
- D. 犀角地黄汤
- E. 血府逐瘀汤

48. 治疗蛔虫病之蛔虫证常选用的方剂是

- A. 保和丸
- B. 乌梅丸
- C. 健脾丸
- D. 使君子散
- E. 人参乌梅汤

49. 猩红热的皮疹出疹时的首发部位是

- A. 耳垂
- B. 鼻准
- C. 面部
- D. 腋下
- E. 臀部

50. 治疗小儿肺炎风寒闭肺证的治法是

- A. 辛温宣肺，化痰止咳
- B. 辛凉宣肺，清热化痰
- C. 清热解毒，泻肺开闭
- D. 清热涤痰，开肺定喘
- E. 养阴清肺，润肺止咳

51. 治疗小儿遗尿肺脾气虚证的首选方剂是

- A. 沙参麦冬汤
- B. 菟丝子散
- C. 龙胆泻肝汤
- D. 交泰丸合导赤散
- E. 补中益气汤合缩泉丸

52. 治疗急性肾小球肾炎水凌心肺证的首选方剂是

- A. 己椒苈黄丸合参附汤
- B. 五味消毒饮合小蓟饮子
- C. 温胆汤合附子泻心汤
- D. 知柏地黄丸合二至丸
- E. 麻黄连翘赤小豆汤合五苓散

53. 既可治疗晕厥又可治疗闪挫腰痛穴位为

- A. 水道
- B. 水沟
- C. 太冲
- D. 委中
- E. 水泉

54. 治疗感冒的主穴是

- A. 列缺、合谷、肺俞、太渊、大椎
- B. 太渊、肺俞、合谷、鱼际、三阴交
- C. 列缺、合谷、大椎、太阳、风池
- D. 鱼际、尺泽、膻中、肺俞、定喘
- E. 尺泽、肺俞、膏肓、太溪、足三里

55. 属于直接灸的是

- A. 瘢痕灸
- B. 蒜泥灸
- C. 隔姜灸
- D. 实按灸
- E. 温灸器灸

56. 下列不属于足太阴经主治范围的是

- A. 肾病
- B. 脾胃病
- C. 妇科病
- D. 下肢病
- E. 前阴病

57. 前额部及眉棱骨等处的头痛多为

- A. 太阳头痛

- B. 厥阴头痛
- C. 阳明头痛
- D. 少阳头痛
- E. 太阴头痛

58. 不属于期门穴主治病证的是

- A. 乳痈
- B. 癃闭、遗尿
- C. 胸胁胀痛
- D. 腹胀、呃逆
- E. 奔豚气

59. 在手指，小指末节桡侧，指甲根角侧上方 0.1 寸的腧穴是

- A. 少商
- B. 中冲
- C. 少冲
- D. 少府
- E. 少泽

60. 系舌根，分散于舌下的经脉是

- A. 足少阴肾经
- B. 足太阴脾经
- C. 足阳明胃经
- D. 足少阳胆经
- E. 足厥阴肝经

61. 治疗滞产，应首选

- A. 太冲
- B. 神门
- C. 血海
- D. 至阴
- E. 合谷

62. 手厥阴心包经的合穴是

- A. 大陵
- B. 曲泽
- C. 巨阙
- D. 神门
- E. 劳宫

63. 足厥阴肝经的起始穴是

- A. 章门
- B. 期门
- C. 大敦

- D. 涌泉
- E. 隐白

64. 足三阴经在足内踝上 8 寸以下的分布规律是

- A. 厥阴在前, 少阴在中, 太阴在后
- B. 少阴在前, 太阴在中, 厥阴在后
- C. 厥阴在前, 太阴在中, 少阴在后
- D. 太阴在前, 少阴在中, 厥阴在后
- E. 太阴在前, 厥阴在中, 少阴在后

65. 仰靠坐位适宜取腧穴的部位是

- A. 身体侧面腧穴和上、下肢部分腧穴
- B. 后头和项、背部的腧穴
- C. 头、面、胸部腧穴和上、下肢部分腧穴
- D. 前头、颜面和颈前等部位的腧穴
- E. 头、项、脊背、腰骶部的腧穴

二、A2

1. 患者, 男, 25 岁, 肩背部常出现多发性圆形肿物, 大小不等, 边界清楚, 基部较广泛, 质软, 有假性波动感, 与周围组织无粘连, 基底部可移动, 但活动度不大, 考虑为

- A. 脂肪瘤
- B. 血管瘤
- C. 纤维瘤
- D. 神经纤维瘤
- E. 皮脂腺囊肿

2. 患者, 男, 32 岁, 重度烧伤, 现症见: 壮热烦躁, 口干喜饮, 便秘尿赤, 舌红绛而干, 苔黄糙, 脉洪数, 此患者属于

- A. 热伤营卫证
- B. 火毒伤津证
- C. 阴伤阳脱证
- D. 火毒炽盛证
- E. 火毒内陷证

3. 患者, 女, 40 岁, 右上腹阵发性绞痛半个月并向右肩胛部放射, B 超胆囊大小正常, 胆汁回声正常, 胆总管轻度扩张, 下端见直径 0.8cm 结石一枚, 胰腺未见异常。首次治疗可首选

- A. 排石疗法
- B. 溶石疗法
- C. 碎石疗法
- D. 取石疗法
- E. 外科手术

4. 患者, 女, 42 岁, 胃溃疡病史 5 年, 现症见: 全腹痛, 腹膜刺激征明显, 肝浊音界消失, X 线检查可见膈下游离气体。诊断考虑为

- A. 溃疡性结肠炎
- B. 急性阑尾炎
- C. 胃溃疡穿孔
- D. 急性胃肠炎
- E. 急性肠系膜淋巴结炎

5. 患者女性，35 岁，转移性右下腹疼痛 3 天，右下腹局限性压痛、反跳痛、肌紧张，腰大肌试验阳性，血白细胞升高，应诊断为

- A. 急性阑尾炎
- B. 慢性阑尾炎
- C. 急性肠梗阻
- D. 肠系膜淋巴结炎
- E. 右侧附件炎

6. 患者，男，33 岁，颈部见紫红色中小瘤体，柔软如海绵，大小不等，边界清楚。指压柔软，有波动感。首先考虑采用的治法是

- A. 冷冻
- B. 激光
- C. 放射疗法
- D. 手术治疗
- E. 硬化剂注射

7. 患者，女性，42 岁。西医上诊断为甲状腺腺瘤。症见：颈部肿物疼痛，坚硬；气急气短，吞咽不利；舌质暗红有瘀斑，脉细涩。治疗方剂宜选用

- A. 逍遥散合海藻玉壶汤
- B. 海藻玉壶汤合神效瓜蒌散
- C. 知柏地黄丸合海藻玉壶汤
- D. 桃红四物汤合海藻玉壶汤
- E. 通窍活血汤合养阴清肺汤

8. 患者，女，42 岁，西医诊断为瘢痕性幽门梗阻，现症见脘腹胀满，餐后加重，朝食暮吐，暮食朝吐，吐出物为食物残渣及秽浊酸臭之黏液；心烦口渴，欲进冷饮，小便黄少，大便干结；舌质红少津，苔黄腻，脉滑数。治疗宜选用

- A. 丁香散
- B. 导痰汤
- C. 麦门冬汤
- D. 大黄黄连泻心汤
- E. 清瘟败毒饮合桃红四物汤

9. 患者，男，38 岁，长期胃肠引流，现症见：表情淡漠、倦怠嗜睡或烦躁不安；肌肉软弱无力，腱反射迟钝或消失，眼睑下垂，每日预防性补钾为

- A. 10~20mmol
- B. 20~30mmol
- C. 30~40mmol

D. 40~50mmol

E. 50~60mmol

10. 患者女，30岁。怀孕2月余，既往有多次堕胎史。近日出现阴道少量流血，色淡黯，腰酸，腹坠痛，头晕耳鸣，两膝酸软，小便频数，夜尿多；舌淡，苔白，脉沉细滑尺弱。诊断为胎漏，治疗方剂首选的是

A. 寿胎丸

B. 胎元饮

C. 保阴煎

D. 补肾固冲丸

E. 桂枝茯苓丸

11. 患者，女，24岁，行经时间延长，量多，色淡质稀，神倦嗜卧，气短懒言，肢软无力，面色（白光）白；舌淡，苔薄白，脉缓弱。首选的治疗方剂是

A. 固经丸

B. 失笑散

C. 举元煎

D. 两地汤

E. 四物汤

12. 患者，女，32岁。近4年经行后腹痛，痛引腰骶，月经量少，色淡暗、质稀，头晕耳鸣，舌有瘀点，苔薄白，脉沉细涩，腹腔镜检查为子宫内膜异位症。治疗应首选的方剂是

A. 右归丸合失笑散

B. 肾气丸合桃红四物汤

C. 五子衍宗丸合失笑散

D. 归肾丸合桃红四物汤

E. 六味地黄丸合桃红四物汤

13. 患者，女，30岁。产后8小时。突然阴道大量下血，色暗红，夹有血块，小腹疼痛拒按，血块下后腹痛减轻；舌紫暗，有瘀点瘀斑，脉沉涩。诊断为产后出血。其首选方剂是

A. 温经汤

B. 血府逐瘀汤

C. 少腹逐瘀汤

D. 化瘀止崩汤

E. 升举大补汤

14. 患者，女，30岁。症见：带下量多，色黄，质稠有臭味，少腹胀痛，胸胁胀痛，心烦易怒，口干口苦但不欲饮；舌红，苔黄腻，脉滑数。诊断为宫颈炎症，其首选方剂是

A. 止带方

B. 完带汤

C. 普济消毒饮

D. 五味消毒饮

E. 龙胆泻肝汤

15. 患者，女性，28 岁。西医诊断为功能失调性子宫出血，现症见经行量多，色深红，质黏稠，口渴心烦，溲黄便结；舌红，苔黄，脉滑数。其治疗首选方剂是

- A. 两地汤
- B. 固经丸
- C. 举元煎
- D. 保阴煎
- E. 桃红四物汤

三、A3/A4

1. 患者女，42 岁，已婚，育有一男一女。宫内置环后出现经量多于既往月经量，经色淡暗，有血块，神疲体倦，面色（白光）白，气短懒言；舌淡，苔薄，脉缓弱。

1) 根据患者症状，此病的中医证型为

- A. 肝郁血瘀证
- B. 阴虚血瘀证
- C. 气虚血瘀证
- D. 气滞证
- E. 瘀热互结证

2) 治疗时采用的治法为

- A. 理气化瘀止血
- B. 滋阴化瘀止血
- C. 益气化瘀止血
- D. 活血化瘀，固冲止血
- E. 凉血化瘀止血

3) 治疗宜选用

- A. 二至丸
- B. 清经散
- C. 生化汤
- D. 八珍汤
- E. 举元煎合失笑散

2. 患者，女，26 岁。诊断为无排卵性功血，症见：经血非时暴下不止，色深红，质稠，口渴烦热，溲黄便结；舌红，苔黄，脉滑数。

1) 根据患者症状，此病的中医证型为

- A. 脾虚证
- B. 血瘀证
- C. 肾阳虚证
- D. 肾阴虚证
- E. 实热证

2) 治疗时采用的治法为

- A. 滋阴清热，止血调经
- B. 清热凉血，止血调经
- C. 活血化瘀，止血调经
- D. 补气摄血，固冲调经
- E. 滋肾养阴，调经止血

3) 治疗首选方为

- A. 保阴煎
- B. 安冲汤
- C. 举元煎
- D. 逐瘀止血汤
- E. 清热固经汤

3. 患者, 女, 31 岁, 已婚。停经 2 月余, 反复少量阴道流血 18 天, 10 天前曾下腹剧痛, 现下腹坠胀。妇科盆腔及 B 超检查: 子宫大小正常, 右附件包块约 7cm×6cm×5cm 大小, 尿妊娠试验可以 (+)。头晕神疲, 舌淡黯, 苔薄白, 脉细滑。

1) 首先考虑的诊断是

- A. 宫外孕为破损型
- B. 宫外孕不稳定型
- C. 宫外孕包块型
- D. 子宫内膜异位症
- E. 右附件炎性包块

2) 中医治法为

- A. 活血祛瘀, 杀胚消癥
- B. 益气化瘀, 消癥杀胚
- C. 回阳救逆, 益气固脱
- D. 活血化瘀, 消癥散结
- E. 益气养血, 调固冲任

3) 治疗首选

- A. 宫外孕 I 号方
- B. 宫外孕 II 号方
- C. 参附汤合生脉散
- D. 理冲丸
- E. 泰山磐石散

4. 患儿, 男, 3 岁。胃脘胀满, 疼痛拒按, 嗳腐吞酸, 呕吐, 呕吐物为不消化食物。舌质红, 苔厚腻, 脉滑。

1) 考虑的诊断为

- A. 腹泻
- B. 胃炎
- C. 消化性溃疡
- D. 急性胰腺炎
- E. 肠蛔虫症

2) 其证型为

- A. 脾胃虚寒
- B. 肝气犯胃
- C. 寒邪犯胃
- D. 乳食积滞
- E. 湿热中阻

3) 中医治疗宜选用

- A. 柴胡疏肝散加减
- B. 黄连温胆汤加减
- C. 香苏散合良附丸加减
- D. 黄芪建中汤加减
- E. 保和丸加减

5. 患儿，6 岁，一侧腮肿大 5 天，症见：壮热不退，头痛项强，嗜睡，伴有惊厥抽搐，舌质绛，舌苔黄，脉数。

1) 西医诊断为流行性腮腺炎，患者中医辨证为

- A. 邪陷心肝证
- B. 毒窜睾腹证
- C. 温毒在表证
- D. 热毒蕴结证
- E. 邪侵肺卫证

2) 其治疗首选方为

- A. 黄连解毒汤
- B. 柴胡葛根汤
- C. 普济消毒饮
- D. 龙胆泻肝汤
- E. 清瘟败毒饮

3) 其治法是

- A. 清气凉营，泻火解毒
- B. 养阴生津，清热润喉
- C. 疏风清热，散结消肿
- D. 清热解毒，软坚散结
- E. 清热解毒，息风开窍

6. 患儿，5 岁。发热恶寒 2 天，无汗，呛咳不爽，呼吸气急，咯白稀痰，口不渴，咽不红，舌苔薄白，脉浮紧。

1) 根据患儿症状此病辨证为

- A. 痰热闭肺证
- B. 风寒闭肺证
- C. 阴虚闭肺证
- D. 肺脾气虚证
- E. 毒热闭肺证

2) 其治法宜选用

- A. 辛凉宣肺，清热化痰
- B. 清热涤痰，开肺定喘
- C. 清热解毒，泻肺开闭
- D. 养阴清肺，润肺止咳

E. 辛温宣肺, 化痰止咳

3) 治疗采用的代表方为

- A. 华盖散
- B. 沙参麦冬汤
- C. 人参五味子汤
- D. 五虎汤合葶苈大枣泻肺汤
- E. 银翘散合麻杏石甘汤

7. 患儿, 男, 10 个月, 有多汗, 夜惊表现, 查体可见方颅, 前囟大, 肋骨串珠, 血钙、磷降低, 碱性磷酸酶升高。惊惕不安, 严重时抽搐, 乏力, 纳呆食少, 坐立行走无力, 舌质淡, 苔薄, 指纹淡紫。诊断为维生素 D 缺乏性佝偻病。

1) 该患儿临床分期最可能是

- A. 初期
- B. 激期
- C. 恢复期
- D. 后遗症期
- E. 中期

2) 中医辨证为

- A. 肾虚骨弱
- B. 肺脾气虚
- C. 脾虚肝旺
- D. 脾胃虚弱
- E. 肝脾不和

3) 治疗代表方是

- A. 四君子汤
- B. 益脾镇惊散
- C. 黄芪桂枝五物汤
- D. 补肾地黄丸
- E. 龙胆泻肝汤

四、B 型题

- 1. A. 阳证疮疡
- B. 寒痹
- C. 行痹
- D. 乳癖
- E. 股肿

1) 攻痛无常, 时感抽掣, 喜缓怒甚的是

2) 痛而酸胀, 肢体沉重, 按之出现可凹性水肿的是

- 2. A. 清营汤
- B. 解毒活血汤
- C. 荆防败毒饮
- D. 五味消毒饮
- E. 清营汤送服安宫牛黄丸

1) 产后高热不退, 神昏谵语, 甚至昏迷, 面色苍白, 四肢厥冷; 舌红绛, 脉微而数。治疗

应首选的方剂是

2) 产后高热汗出，烦躁不安，皮肤斑疹隐隐；舌红绛，苔黄燥，脉弦细而数。治疗应首选的方剂是

3. A. 宫外孕Ⅰ号方

B. 宫外孕Ⅱ号方

C. 参附汤合生脉散

D. 固冲汤

E. 理冲丸

1) 包块型异位妊娠方剂首选

2) 异位妊娠未破损期方剂首选

4. A. 膈下逐瘀汤

B. 少腹逐瘀汤

C. 清热调血汤

D. 苍附导痰汤

E. 理冲汤

1) 寒凝血瘀型子宫内膜异位症首选方剂是

2) 气虚血瘀型子宫内膜异位症首选方剂是

5. A. 连翘败毒散

B. 小蓟饮子

C. 大蓟饮子

D. 济生肾气丸

E. 知柏地黄丸

1) 治疗小儿尿血下焦湿热证首选的方剂是

2) 治疗小儿尿血脾肾两虚证首选的方剂是

6. A. 玉屏风散合牡蛎散

B. 黄芪桂枝五物汤

C. 生脉散

D. 泻黄散

E. 九仙散

1) 治疗肺卫不固型小儿汗证，方剂宜选用

2) 治疗营卫失调型小儿汗证，方剂宜选用

7. A. 在气海、三阴交、肝俞、太溪、肾俞基础上加关元、命门

B. 在气海、三阴交、肝俞、太溪、肾俞基础上加照海、阴谷

C. 在气海、三阴交、肝俞、太溪、肾俞基础上加百会、风池、太冲

D. 在气海、三阴交、肝俞、太溪、肾俞基础上加中脘、阴陵泉、丰隆

E. 在气海、三阴交、肝俞、太溪、肾俞基础上加归来、隐白

1) 绝经前后诸证肾阳不足证，治疗应

2) 绝经前后诸证肾阴亏虚证，治疗应

- 8. A. 手少阳三焦经
 - B. 手太阳小肠经
 - C. 足阳明胃经
 - D. 足太阳膀胱经
 - E. 足少阳胆经
- 1) 从耳后，入耳中到达目外眦的经脉是
 - 2) 从耳后进入耳中，出走耳前，达目外眦后方的经脉是

