

医学教育网口腔执业医师:《答疑周刊》2022年第12期

问题索引: 1. 临床上止血效果最明显、最可靠的方法是?

2. 常用的下颌下切口位于?

3. 钝性分离常用的器械是?

具体解答

1. 临床上止血效果最明显、最可靠的方法是?

口腔颌面部创伤后,活动性的出血时,最可靠的止血方法是

- A. 药物止血
- B. 结扎止血
- C. 填塞止血
- D. 包扎止血
- E. 降压止血

【答案】B

【解析】结扎止血是临床上止血[医学教育网]效果最明显、最可靠的方法。

2. 常用的下颌下切口位于?

根据面神经下颌缘支的行径,颌下区的手术切口应

- A. 低于下颌骨下缘 0.5~1cm
- B. 高于下颌骨下缘 0.5cm左右
- C. 低于下颌骨下缘 1.5cm左右
- D. 平齐下颌骨下缘
- E. 低于下颌骨下缘 2.5cm以下

【答案】C

【解析】常用的下颌下切口,宜在下颌骨[医学教育网]下缘下 1.5cm左右,如此可避免损伤面神经下颌缘支(该支在下颌骨下缘 0.3~1.4cm处斜行向上)。

3. 钝性分离常用的器械是?

钝性分离最常使用的分离器械是

- A. 锐性的手术刀
- B. 手术剪
- C. 血管钳
- D. 刀柄
- E. 手指

【答案】C

【解析】钝性分离用于正常肌肉和疏松[医学教育网]结缔组织的分离以及有包膜的良性肿瘤的摘除。主要以血管钳进行，也可使用刀柄、手指、纱布等，可在非直视下进行。