

医学教育网初级护师:《答疑周刊》第 50 期

问题索引:

1. 【问题】亚硝酸钠和碳酸氢钠都可以防锈, 区别是什么?
2. 【问题】尿潴留为什么不能立即行导尿术?
3. 【问题】休克的临床表现?
4. 【问题】服用铁剂的最佳时间是?

具体解答:

1. 【问题】亚硝酸钠和碳酸氢钠都可以防锈, 区别是什么?

【解答】煮沸消毒金属器械时, 为了增强杀菌作用和去污防锈, 可加入碳酸氢钠。戊二醛对碳钢类制品如手术刀片等有腐蚀性, 使用前应加入 0.5%亚硝酸钠防锈。

2. 【问题】尿潴留为什么不能立即行导尿术?

【解答】尿潴留: 因充盈的膀胱可影响子宫收缩, 故产后 4 小时应排尿。如有尿潴留, 应积极处理。协助产妇坐起或下床小便、用温开水冲洗外阴或听流水声音诱导排尿反射, 也可按摩膀胱, 无效时, 才应导尿并留置导尿管。[医学/教育网]

3. 【问题】休克的临床表现?

【解答】临床表现

分期	休克代偿期		休克抑制期	
	轻度休克	中度休克	重度休克	
神志	清楚	尚清楚、表情淡漠	模糊、昏迷	
口渴	口渴	很口渴	非常口渴 (可无主诉)	
皮肤	开始苍白、发凉	苍白、发冷	显著苍白、青紫、厥冷	
血压	正常或轻度增高	降低[医学教育网]	收缩压<70mmHg 或无	
尿量	正常	少尿	少尿或无尿	
失血量	<20% (800ml)	20%~40%	>40% (1600ml)	

4. 【问题】服用铁剂的最佳时间是?

【解答】不同版本教材对其描述也不同。[医学/教育网]在内科护理学中，铁剂是在餐后服用；在儿科护理学中，铁剂是在两餐之间。建议您结合题干及选项进行选择；如题干描述是成人服用铁剂，建议选餐后服用；如题干描述为“患儿”，则建议选两餐之间服用；若题干不涉及具体病例，建议选“餐后服用”。



正保医学教育网

www.med66.com