

2022 年全科主治医师必备考点 (71-80)

【考点 71】世界卫生组织按疾病性质和严重程度，将残疾分为三类

1. 损伤：指身体结构或生理功能（包括精神功能）的丧失或异常。一般认为属于器官水平的功能障碍。
2. 活动受限：指个体在进行活动时遇到困难。认为属个体水平的功能障碍。
3. 参与局限：指个体投入到生活情景中遇到困难。属于社会水平的障碍。

【考点 72】完全性葡萄胎的典型症状

- (1) 停经后阴道流血：为最常见的症状。一般停经时间为 8~12 周，停经后有不规则阴道流血，量多少不定，时出时停，反复发生，逐渐增多。
- (2) 子宫异常增大、变软：约半数以上的子宫体积大于停经月份，质地变软，并伴血清 hCG 水平异常升高。
- (3) 腹痛：表现为阵发性下腹痛，一般不剧烈，能忍受，常发生于阴道流血之前。若发生卵巢黄素化囊肿扭转或破裂，可出现急性腹痛。
- (4) 妊娠呕吐：出现时间一般较正常妊娠早，症状严重且持续时间长。
- (5) 妊娠期高血压疾病征象：出现时间较正常妊娠早，可在妊娠 20 周前出现高血压、蛋白尿和水肿，而且症状严重，容易发展为子痫前期，但子痫罕见。
- (6) 卵巢黄素化囊肿：由于大量 HCG 刺激卵巢卵泡内膜细胞发生黄素化而形成囊肿，称卵巢黄素化囊肿。常为双侧性的，但也可单侧，大小不等，一般无症状。黄素化囊肿常在水泡状胎块清除后 2~4 个月自行消退。
- (7) 甲状腺功能亢进征象：约 7% 的患者出现轻度甲状腺功能亢进表现，如心动过速、皮肤潮湿和震颤，但突眼少见。这类患者 HCG 水平异常增高，T₃、T₄ 水平升高。

【考点 73】病理性黄疸

新生儿黄疸出现下列情况之一时要考虑为病理性黄疸：① 生后 24 小时之内出现黄疸，胆红素浓度 $> 102 \mu\text{mol/L}$ (6mg/dl)。② 足月儿血清胆红素浓度 $> 220.6 \mu\text{mol/L}$ (12.9mg/dl)，早产儿 $> 255 \mu\text{mol/L}$ (15mg/dl)。③ 血清结合胆红素 $> 26 \mu\text{mol/L}$ (1.5mg/dl)。④ 血清胆红素每天上升 $88 \mu\text{mol/L}$ (5mg/dl)。⑤ 黄疸持续时间较长，超过 2~4 周，或进行性加重。

【考点 74】轮状病毒肠炎

轮状病毒是秋冬季小儿腹泻最常见的病原。本病多见于6~24个月小儿，潜伏期1~3天，常伴发热及上呼吸道感染症状。病初易吐，大便次数多、量多、水多，呈黄色水样或蛋花汤样，无腥臭味，镜检偶有少量白细胞。常并发脱水、酸中毒及电解质紊乱。一般病程3~8天，呈自限性过程。

【考点75】肠套叠临床表现

主要表现为阵发性哭闹、腹痛、呕吐，便血，腹部肿块。

(1) 腹痛：特点为间歇性绞痛。患儿突然出现阵发性的哭闹，发出异样的高声哭叫，伴四肢乱动，这是一种腹痛的表现，经过10~20分钟后可恢复平静，甚至可入睡，但隔不多时又有反复发作。部分病例仅表现阵发性呻吟、烦躁不安或面色苍白等。

(2) 呕吐：几乎全部婴儿及80%以上的年长儿有呕吐。婴儿发生呕吐较早，吐出物为奶块或所进之食物。早期呕吐为肠系膜牵拉所产生的反向作用所致。较晚期呕吐物可为胆汁。

(3) 便血：可在发病最初2~3小时出现，也可能24小时内不出现。典型大便为果酱样大便。

(4) 腹部检查：早期腹部平坦、软、无压痛。仔细扪诊在右上腹部多可触及腊肠状肿块，稍可活动。患儿不合作时不易触到。

【考点76】抑郁发作临床表现

抑郁发作通常包括三大核心症状：①心境低落；②兴趣和愉快感丧失；③导致劳累感增加和活动减少的精力不足。其他常见症状包括：

- (a) 集中注意和注意的能力降低；
- (b) 自我评价和自信降低；
- (c) 自罪观念和无价值感（即使在轻度发作中也有）；
- (d) 认为前途暗淡悲观；
- (e) 自伤或自杀的观念或行为；
- (f) 睡眠障碍；
- (g) 食欲下降。

【考点77】分离（转换）性障碍临床表现及分型

分离（转换）性障碍原称癔症

(1) 分离性遗忘、分离性漫游、分离性木僵和出神与附体障碍：可以表现为情感暴发，意识范围缩小，无目的漫游，选择性遗忘，自我身份识别障碍，鬼神附体感，假性痴呆，或精神病样症状如行为幼稚、动作矫饰、哭笑无常、片断的幻觉或妄想等。

(2) 分离性运动和感觉障碍：可为躯体运动不能，如肢体瘫痪、不能站立或行走、抽搐发作等；或躯体感觉受损，如失明、失声、失聪或某种皮肤感觉部分或全部丧失；以及其他感觉异常，如咽部异物感等，但缺乏神经解剖基础。

(3) 其他分离（转换）性障碍：包括 Ganser 综合征，特征是“近似回答”，常伴有其他几种分离性症状，其发生背景提示有心理原因存在；多重人格障碍，基本特征是，同一个体具有两种或更多完全不同的人格，但在某一时间，只有其中之一明显。每种人格都是完整的，有自己的记忆、行为、偏好，可与单一的病前人格完全对立。

【考点 78】龋病诊断要点

1. 浅龋

(1) 患者一般无自觉症状。

(2) 在窝沟或平滑面的病损部位呈弥散的墨浸状或白垩色斑点改变。

(3) 探诊检查，尖头探针可插入龋洞中或略感粗糙。

(4) X 线检查，牙体缺损处可显示黑色透射影像。

2. 中龋

(1) 患者有时对冷热酸甜等刺激较为敏感，刺激去除后症状立即消失。

(2) 探诊检查，可探及较深的龋洞，洞内有棕色或黑棕色的软化牙本质。

3. 深龋

(1) 患牙遇冷热酸甜等刺激，可产生较明显的疼痛。

(2) 当食物嵌塞在龋洞中，可引起疼痛。

(3) 可探查至很深的龋洞，对探诊反应敏感，但未穿髓。

【考点 79】慢性龈缘炎

慢性龈缘炎又称边缘性龈炎或单纯性龈炎，是最常见的牙龈炎。儿童在 3~5 岁时就可能患病，随着年龄增长，患病率和严重程度逐渐增加。本病治愈后仍可复发，部分慢性龈炎患者可发展为牙周炎。牙菌斑是引起本病的始动因素，其他如牙石、食物嵌塞、不良修复体、牙错位拥挤等均可促进菌斑的堆积，引发和加重牙龈的炎症。

【考点 80】慢性牙周炎诊断要点

1. 常见于成年人，也可发生于儿童和青少年，病情呈缓慢加重。
2. 通常发生于一组牙或整个牙列，也可发生于单个牙。
3. 牙龈红肿，刷牙或进食时易出血，少数有自发性出血。
4. 牙周袋的形成、附着丧失是牙周炎的特殊损害，也是牙周炎区别于牙龈炎的主要特点。牙周袋扪诊时可有溢脓，急性感染时可形成牙周脓肿。
5. 早期牙齿不松动，晚期可出现牙齿松动、移位。
6. X 线片可见牙槽骨水平型和垂直型吸收。

