

医学教育网主管护师:《答疑周刊》2023年第16期

问题索引:

1. 【问题】流产临床类型的鉴别。
2. 【问题】腹股沟斜疝与直疝的区别。
3. 【问题】腮腺炎, 麻疹, 水痘, 猩红热等传染病的鉴别。

具体解答:

1. 【问题】流产临床类型的鉴别。

【解答】

类型	先兆流产	难免流产	不全流产	完全流产
流血	少	增多	多	少→无
腹痛	轻	加重	减轻	无
组织排除	无	无	常有(部分)	有(完全)
宫口	闭	可能扩张	扩张或组织堵塞	闭
子宫大小	与孕周相符	与孕周相符或略小	小于孕周	正常或略小于孕周
B超	胚胎存活	胚胎死亡	残留组织	正常宫腔
处理	可保胎	尽早刮宫	立即刮宫	不必处理

2. 【问题】腹股沟斜疝与直疝的区别。

【解答】

	斜疝	直疝
发病年龄	多见儿童、青壮年	多见老年
突发途径	经腹股沟管, 可进阴囊	经直疝三角, 不进阴囊
疝块外形	椭圆或梨形、上部呈蒂柄状	半球形, 底宽
压迫深环(内口)实验	疝回纳后压住深环, 增	压住深环后增高腹内

	高腹内压疝块不再突出	压疝块仍突出
嵌顿机会	较多	无或极少
精索与疝囊的关系	精索在疝囊后方	精索在疝囊前方
疝囊颈与腹壁下动脉关系	疝囊颈在腹壁下动脉外侧	疝囊颈在腹壁下动脉内侧

3. 【问题】腮腺炎，麻疹，水痘，猩红热等传染病的鉴别。

【解答】

疾病	病原体	出疹顺序	临床及皮疹特点
麻疹	麻疹病毒	耳后发际→额、颈、面→自上而下至躯干和四肢→手掌和足底	疹出热盛；皮疹初为红色斑丘疹，呈充血性，略高出皮面
风疹	风疹病毒	面部→颈部→躯干→四肢	疹退时体温恢复正常；皮疹呈猩红热样斑疹，但形态多变
幼儿急疹	人类疱疹病毒6型	无明显顺序，主要见于躯干、颈部、上肢	热退疹出；皮疹呈红色斑疹或斑丘疹，很少融合
水痘	水痘-带状疱疹病毒	向心性，开始为头皮→面部→躯干→腰部→四肢端较少	斑疹、丘疹、水疱疹、结痂疹同时存在分批出现
手足口病	多种肠道病毒	主要位于手、足的掌侧面	急性起病，疱疹周围有炎性红晕，疱内液体较少，不痛、不痒、不结痂、不留疤
猩红热	A组β溶血性链球菌	颈部→腋下→腹股沟→24h内遍及全身	全身皮肤弥漫性充血发红，其间广泛存在密集而均匀的小丘疹，呈鸡皮疹，触之砂质感