

医学教育网执业西药师: 《答疑周刊》2023年第12期

问题索引:

1. 【问题】常用抗癫痫药物不良反应有哪些?
2. 【问题】支气管哮喘用药注意事项有哪些?

具体解答:

1. 【问题】常用抗癫痫药物不良反应有哪些?

药物	不良反应	对肝药酶的影响
苯妥英钠	共济失调、视物模糊、齿龈增生、镇静作用	诱导
卡马西平	共济失调、复视、肝损伤、皮疹、低钠血症、骨髓抑制、白细胞减少、可发生抗惊厥药物过敏综合征等严重不良反应	诱导
丙戊酸钠(镁)	胃肠功能紊乱、脱发、体重增加、肝毒性、血小板减少、低纤维蛋白原血症	抑制
苯巴比妥	镇静作用, 认知障碍、低钙血症、叶酸缺乏	诱导
奥卡西平	镇静、疲劳、困倦、头晕、恶心、皮疹、低钠血症、共济失调、复视	诱导
拉莫三嗪	皮疹、头痛、疲劳、嗜睡、失眠、头晕、震颤、共济失调、背痛、恶心、呕吐、腹泻、攻击行为、易激惹	无明显作用
左乙拉西坦	嗜睡、敌意、神经质、情绪不稳、易激动、食欲减退、乏力、头晕、头痛	无明显作用
托吡酯	嗜睡、头晕、疲乏、易激惹、体重下降、思维迟钝、感觉异常、复视、协调失常、恶心、眼球震颤、困倦、厌食症、构音不良、视物模糊、食欲下降、记忆损害、腹	弱诱导

	泻	
--	---	--

2. 【问题】支气管哮喘用药注意事项有哪些？

短效 β_2 受体激动剂	①沙丁胺醇、特布他林 ②不宜长期、单一使用。主要不良反应有心悸、骨骼肌震颤和低钾血症
长效 β_2 受体激动剂	①福莫特罗起效快，也可作为缓解药物按需使用 ②不推荐长期单独使用 LABA——增加哮喘患者死亡的风险
糖皮质激素类	①不良反应：声音嘶哑、咽部不适和念珠菌感染 ②吸入后应立即漱口 ③长期高剂量吸入可导致骨质疏松
茶碱类	心律失常；个体差异大，应进行血药浓度监测（TDM）
抗胆碱药	①短效：异丙托溴铵；长效：噻托溴铵 ②不良反应：口干、妊娠早期妇女、青光眼与前列腺肥大的患者应慎用此类药物； ③使用异丙托溴铵可出现口中苦涩的金属味