

医学教育网执业西药师:《答疑周刊》2023年第13期

问题索引:

1. 【问题】一些药物用药注意事项有哪些?
2. 【问题】药品贮存条件与方法有哪些?
3. 【问题】各种剂型的注意事项有哪些?

具体解答:

1. 【问题】一些药物用药注意事项有哪些?

药物	注意事项
催眠药、抗抑郁药	用药期间不饮酒(或含酒精的饮料)
卡马西平、苯妥英钠、普萘洛尔、维拉帕米、氯苯那敏	服药期间不要驾车、操作机器或高空作业
磺胺类、氟喹诺酮类药物	可产生结晶尿需多喝水
特拉唑嗪、多沙唑嗪	可引起体位性低血压,服用后患者应注意从低位向高位的转换动作时均应缓慢
ACEI类药物	若咳嗽厉害,应暂停用药并及时复诊
吸入型糖皮质激素	吸入药物后应漱口,并将漱口水吐出
铋制剂	可使舌苔、大便呈灰褐色
利福平	可使尿液、泪液呈橙红色(或者说橘红色)
吡哌美辛	可使粪便呈绿色
铁剂	可使大便呈褐色
维生素 B ₂	可使小便呈黄色

2. 【问题】药品贮存条件与方法有哪些?

特殊包装或特殊装置药品	使用提示
包装	所有药品应保存在原始包装中,并不要将药瓶的外标签撕掉
存放	外用药品与内服药品分开摆放,置于儿童不能拿到的地方
一般药品	防霉、防潮、避免阳光直射

生物制剂	置于 2~8℃ 保存
外用栓剂 如: 吡哌美辛栓、复方甲硝唑栓、复方莪术油栓等	应放置在凉暗处贮存; 如因温度变高而软化, 可以将其放入冰箱冷藏室, 待其定型后重新使用
米索前列醇	应交代患者保存药品时避免受热与受潮, 以避免效价降低

3. 【问题】各种剂型的注意事项有哪些?

剂型	常考知识点总结
泡腾片	严禁直接服用或口服
舌下片	含后 30 分钟内不宜吃东西或饮水
咀嚼片	在口腔内的咀嚼时间宜充分; 用于中和胃酸时, 宜在餐后 1~2 小时服用
含漱剂	含漱后不宜马上饮水和进食, 以保持口腔内药物浓度
阴道栓	给药后 1~2 小时不排尿
直肠栓	如栓剂变软, 可放入冰箱或凉水中, 直到变硬为止; 推入直肠, 距肛门口成人 3cm, 儿童 2cm; 给药后 1~2 小时不排便
缓、控释制剂	一般应整片或整丸吞服, 严禁嚼碎和击碎分次服用; 给药时间固定