

医学教育网护士执业资格：《答疑周刊》2024年第24期

问题索引：

1. 【问题】低分子右旋糖酐和中分子右旋糖酐临床应用。
2. 【问题】不同类型药物的服用方法？
3. 【问题】肛周脓肿用什么抗生素？

具体解答：

1. 【问题】低分子右旋糖酐和中分子右旋糖酐临床应用。

【解答】右旋糖酐：常用的溶液分两种：

- ①中分子右旋糖酐：可提高血浆胶体渗透压，扩充血容量；
- ②低分子右旋糖酐：可降低血液黏稠度，改善微循环。

2. 【问题】不同类型药物的服用方法？

【解答】根据药物性能，指导病人合理用药，以提高疗效，减少不良反应。

具体要求如下：

(1) 某些对牙齿有腐蚀作用或使牙齿染色的药物：如酸剂、铁剂，服用时应避免与牙齿接触，可由饮水管吸入，服后再漱口。

(2) 刺激食欲的药物：宜在饭前服，以刺激舌的味觉感受器，使胃液大量分泌，增进食欲。[医学/教育网]

(3) 对胃黏膜有刺激的药物或助消化药：宜在饭后服用，使药物与食物充分混合，以减少对胃黏膜的刺激，利于食物的消化。

(4) 止咳糖浆：对呼吸道黏膜起安抚作用，服后不宜立即饮水。如同时服用多种药物，应最后服用止咳糖浆，以免冲淡药液，使药效降低。

(5) 磺胺类药物：服药后指导病人多饮水，以防因尿少而析出结晶，堵塞肾小管。

(6) 发汗类药：服药后指导病人多饮水，以增强药物疗效。

(7) 强心苷类药物：服用前，应先测脉率、心率，并注意节律变化。如脉率低于60次/分或节律不齐，则应停止服用，及时与医生联系，酌情处理。

3. 【问题】肛周脓肿用什么抗生素？

【解答】直肠肛管周围脓肿：全身应用对革兰氏阴性杆菌敏感的抗菌药物控制感染；条件成熟时应穿刺抽取脓液，并根据药敏结果选择[医学教育网原创]和调整敏感抗菌药物。

